

Листовка: информация за потребителя
Грипофен® С 500 mg/25 mg/200 mg прах за
перорален разтвор
Парацетамол/Фенираминов maleат/Аскорбинова киселина

Gripofen® C 500 mg /25 mg/200 mg powder for oral solution
Paracetamol/Pheniramine maleate/Ascorbic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно, както е описано в тази листовка, или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 до 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Грипофен С и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Грипофен С
3. Как да използвате Грипофен С
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Грипофен С
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	20120220
Към Рег. №	86/МА/МР-50580
Разрешение №	28-05-2020
Одобрение №	

1. Какво представлява Грипофен С и за какво се използва

Това лекарство съдържа парацетамол.

Лекарството е комбинация от антипиретик/аналгетик, антиалергично средство и аскорбинова киселина.

Грипофен С се използва за лечение на простуда, алергичен ринит, ринофарингит и грипоподобни състояния при възрастни и деца над 15 години.

Ако симптомите на повишена температура продължат повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни и/или се влошат, или се появи друг симптом след приемане на лекарството, ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Грипофен С

Не приемайте Грипофен С:

- ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки (изброени в т.6).

Това лекарство не трябва да се използва в следните случаи:

- сериозно чернодробно заболяване;
- някои форма на глаукома;
- заболявания на простатата и пикочните пътища;
- при деца под 15 години.

Предупреждения и предпазни мерки:

Консултирайте се веднага с Вашия лекар или фармацевт, в случай на предозиране или случайно приемане на свръх висока доза.

Грипофен С съдържа парацетамол. Други лекарства също съдържат тази субстанция, но



комбинирайте с такива лекарства, за да не надхвърлите препоръчваната дневна доза (виж Как да приемате Грипофен С).

Температурата трябва да спадне бързо.

Не приемайте по-висока доза от посочената в тази листовка и в случай на предозиране веднага се консултирайте с лекар.

Не използвайте това лекарство за продължително лечение, ако не е предписано от лекар, особено ако симптомите на повишена температура продължава повече от 3 дни, а другите симптоми - повече от 5 дни и/или се влошат, или се появи друг симптом след приемане на лекарството.

- Информирайте Вашия лекар или фармацевт в случай на бъбречно заболяване, бременност и кърмене;
- Информирайте Вашия лекар или фармацевт когато едновременно с Грипофен С вземате и друго лекарство;
- По време на лечението не трябва да се приема алкохол или седативни средства.

Деца

Грипофен С не трябва да се използва при деца под 15 годишна възраст.

Други лекарства и Грипофен С

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, накърто сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

За да избегнете вредните ефекти от предозиране, НЕ КОМБИНИРАЙТЕ с други лекарства съдържащи антихистамини или парacetамол БЕЗ КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР.

Когато се съмнявате, не се колебайте да се обадите на Вашия лекар или фармацевт.

Грипофен С с храни, напитки и алкохол

По време на лечението не трябва да се приема алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Като предпазна мярка, това лекарство не е препоръчително по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Хората, които шофират моторни превозни средства или работят с машини, трябва да имат предвид, че при употребата на това лекарство има риск от съниливост.

Този ефект се усилва при едновременно приемане на алкохол или лекарства съдържащи алкохол.

3. Как да приемате Грипофен С

Винаги приемайте това лекарство точно, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза за възрастни и деца над 15 години е:

По 1 саше, два или три пъти на ден.

Интервалът между два приема трябва да бъде най-малко 4 часа.

Съдържанието на 1 саше се разтваря в чаша гореща или студена вода и се изпива.

Перорално приложение.



При грипоподобни състояния се препоръчва Грипофен С да се приема с гореща вода вечер. В случай на остра бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 10 ml/min) интервалът между два приема трябва да бъде поне 8 часа. Не използвайте това лекарство за продължително лечение без консултация с лекар, особено ако симптомите продължават повече от 5 дни.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Грипофен С

В случай на случайно или преднамерено предозиране информирайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Грипофен С може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции са класифицирани според честотата на тяхната појава и се разделят на:

- Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души;
- Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души;
- Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души;
- Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 души;
- Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души;
- С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Възможни са следните нежелани реакции, които са много редки или с неизвестна честота:

- Настъпване на остръ пристъп на глаукома при хора, които имат такова предразположение;
- Нарушения при уриниране (значително намаляване на урината, затруднено уриниране);
- Сухота в устата, нарушения на акомодацията (способността на окото да се нагласява за виждане на различни разстояния), запек;
- Нарушения на паметта или концентрацията, объркване, световъртеж (по-често при пациенти в напреднала възраст);
- Липса на координация в движенията, треперене;
- Съниливост, занижено внимание – по-ясно изразено в началото на лечението;
- Съобщава се за редки случаи на кожен обрив, зачервяване на кожата, или алергична реакция под формата на внезапен оток на лицето или шията, или внезапно неразположение с понижение на кръвното налягане. Лечението трябва незабавно да се спре, да се потърси лекарска помощ и да не се приемат повече лекарства съдържащи парацетамол или фенирамин;
- Съобщава се за няколко редки случая на промяна в резултатите на лабораторните изследвания, например много ниски нива на някои бели кръвни телца или тромбоцити, което може да доведе до кървене от носа или венците. В такъв случай се консултирайте с лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вижте детайлите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна Агенция по Лекарствата
София 1303, ул. Дамян груев 8
Тел.: +359 28903417
Уебсайт: www.bda.bg



5. Как да съхранявате Грипофен С

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25° С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Грипофен С

Активните вещества са:

Парацетамол (Paracetamol) 500 mg

Фенираминов maleат (Pheniramine maleate) 25 mg

Аскорбинова киселина (Ascorbic acid) 200 mg

Другите съставки са: манитол, натриев цикламат Е952, захарин натрий Е954, аромат лимон, лимонена киселина безводна, силициев диоксид колоиден, безводен.

Как изглежда Грипофен С и какво съдържа опаковката

Прах за перорален разтвор в саше.

Съдържимото на сашето е почти бяла смес от прах и суhi агломерати

Всяка кутия съдържа – 8, 10, 15, 20 сашета и листовка за пациентта.

Притежател на разрешението за употреба и производител

„Адифарм“ ЕАД

Бул. „Симеоновско шосе“ 130

1700, София

България

Произведено за:

Софарма АД

Адрес: ул. „Илиенско шосе“ 16, 1220 София

България

Грипофен® е запазена марка на Софарма АД

Дата на последно преразглеждане на листовката: Април 2020 г.

