

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20010301
Разрешение №	-67125
BG/MA/MP	18-11-2024

Листовка: информация за пациента

ГЕНТАМИЦИН ВИЖЪН 3 mg/g маз за очи
GENTAMICIN VISION 3 mg/g eye ointment
Гентамицин/Gentamicin

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява Гентамицин Вижън и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Гентамицин Вижън
3. Как да използвате Гентамицин Вижън
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Гентамицин Вижън
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Гентамицин Вижън и за какво се използва

Гентамицин е антибиотик от групата на аминогликозидите, който е активен спрямо голям брой микроорганизми, които често причиняват инфекции на очите и клепача.

Гентамицин Вижън маз за очи се прилага за лечение на инфекции на окото и околните тъкани, причинени от бактерии, чувствителни към неговото действие:

- възпаления на клепача;
- ечемик;
- възпаления на слъзната торбичка
- конюнктивити;
- възпаления на роговицата, язва на роговицата;
- вторични инфекции след язва или херпесна инфекция на роговицата.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Гентамицин Вижън


Не използвайте Гентамицин Вижън

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към гентамицин или към някоя от останалите съставки на това лекарство, изброени в точка 6.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да използвате Гентамицин Вижън:

- Ако получите сърбеж и подуване на клепачите, зачервяване на окото, слъзотечение, обрив по кожата или друг симптом на алергична реакция, преустановете прилагането на Гентамицин Вижън и се обърнете към лекуващия Ви лекар.
- Необходимо е да знаете, че ако имате или сте имали алергия към други антибиотици от тази група (напр. тобрамицин), възможността за поява на алергична реакция е по-висока.
- Дългата употреба на Гентамицин Вижън, както и на други антибиотични продукти, може да доведе до развитие на супер-инфекция с бактерии или гъбички, нечувствителни към антибиотика. Използвайте Гентамицин Вижън толкова дълго, колкото Ви е предписано.



- Употребата на Гентамицин Вижън маз за очи може да забави зарастването на роговични рани.

Други лекарства и Гентамицин Вижън

Информирайте Вашия лекар, ако приемате/използвате, наскоро сте приемали/използвали или е възможно да приемете/използвате други лекарства.

При едновременно приложение с други аминогликозидни антибиотици, трябва да уведомите за това вашия лекар, който ще прецени дали се налага да се следи общото им ниво в кръвта.

Прием на Гентамицин Вижън с храни и напитки

Не са установени взаимодействия.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Лечението с аминогликозидни антибиотици може да увреди слуховия нерв и да доведе до глухота. Навлизането на гентамицин в кръвта при локално приложение в окото обаче е слабо и се смята, че този риск при използване на Гентамицин Вижън маз за очи е нисък. Въпреки това се препоръчва употребата на продукта по време на бременност и кърмене да се назначава само при категорична необходимост и след внимателна преценка на съотношението полза за майката риск за плода и новороденото.

Шофиране и работа с машини

Както при всички лекарства за очи, временно замъгляване на зрението или други смущения могат да повлияят способността за шофиране или работа с машини. След поставянето на Гентамицин Вижън, изчакайте докато зрението Ви се проясни преди да започнете да работите с машини или да шофирате.

Информация относно някои от съставките на Гентамицин Вижън

Гентамицин Вижън маз за очи съдържа ланолин, пропилхидроксibenзоат и метилхидроксibenзоат в състава си, които могат да предизвикат локални алергични реакции.

Важно е да знаете, че не трябва да носите контактни лещи при наличие на очна инфекция и по време на лечение с продукта.

3. Как да използвате Гентамицин Вижън

Винаги използвайте Гентамицин Вижън точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни, юноши и лица в напреднала възраст (над 65 год.)

Препоръчвана доза при тежки инфекции - неголямо количество от лекарството (лентичка с дължина около 1.5 см) се поставя в конюнктивалния сак на засегнатото око/очи на всеки три до четири часа през първите два дни до постигане на клинично подобрене, след което два - четири пъти дневно до излекуване на инфекцията.

Препоръчвана доза при леки и умерено тежки инфекции - неголямо количество от лекарството (лентичка с дължина около 1.0 - 1.5 см) се поставя в конюнктивалния сак на засегнатото око/очи, два - четири пъти дневно.

Употреба при деца

Продуктът може да се използва при деца в същата дозировка както при възрастни.

Употреба при пациенти с чернодробни и бъбречни заболявания



При тези болни не се налага промяна в препоръчаната доза, тъй като не се установяват високи концентрации от активното вещество в кръвта след приложение в очите. Ако едновременно с този продукт Вие се лекувате с други аминогликозиди, Вашият лекар ще прецени необходимостта от контролиране на общата им концентрация в кръвта.

Дозата и продължителността на лечение се определят от лекуващия лекар. Обичайната продължителност на лечението е 7-10 дни.

Ако се лекувате и с други продукти, предназначени за прилагане в окото, поставяйте ги последователно поне през 5-10 минути, като тези, под формата на маз, трябва да се поставят последни.

Важно е да се спазва хигиена по време на поставяне на очната маз и да се избягва допирът на върха на тубичката с окото или с околните предмети, тъй като може да се замърси и това да доведе до развитието на очна инфекция със сериозни последици за окото, дори, загуба на зрение. Винаги мийте ръцете си преди използване на тубата!

Ако мислите, че Вашата тубичка е замърсена, потърсете Вашия лекар преди да продължите употребата на тази маз за очи.

Инструкции за употреба

1. Преди да използвате тубата за първи път, уверете се, че предпазната лента между капачката и тубата, не е разкъсана. Измийте ръцете си и отворете капачката.
2. Дръжте тубата между палеца и показалеца, възможно най-близо до клепача, без да го докосвате
3. Наклонете глава леко напред и дръпнете долния клепач надолу. Така се оформя „джоб“ между клепача и окото. Лентичката от очната маз ще попадне точно на това място.
4. Внимавайте да не докосвате окото, клепачите или други повърхности с върха на тубата. Внимателно изстискайте лентичка от мазта, с дължина около 1-1,5 см, която да попадне в оформения „джоб“ на долния клепач.
5. След като поставите Гентамицин Вижън, затворете леко клепача за 1-2 минути и завъртете очната ябълка във всички посоки, за да се разнесе мазта по цялата очна повърхност.
6. С чиста кърпичка почистете клепача и миглите от излишната маз за очи. С друга чиста кърпа почистете върха на тубичката и затворете капачката плътно.
7. Ако трябва да използвате очната маз и за двете очи, повторете всички предходни стъпки и за другото око.

Използвайте тази тубичка Гентамицин Вижън само за Вашите очи!

Ако сте използвали повече от необходимата доза Гентамицин Вижън

Не употребявайте лекарството по-често или за по-продължително време от указаното от лекаря за да се избегне предозиране. Ако все пак Вие инцидентно сте използвали повече от предписаната доза, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, макар че обикновено е достатъчно окото да се измие обилно с хладка вода.

При точно спазване на инструкциите за употреба на продукта е много малко вероятно да се получи предозиране. При поглъщане по невнимание, количеството което ще премине в кръвта също е нищожно.

Ако сте пропуснали да използвате Гентамицин Вижън

Не използвайте по-голямо от необходимото количество, за да компенсирате пропуснато приложение. Приложете обичайната доза колкото е възможно по-скоро след като сте установили пропуса и продължете лечението по обичайния начин.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Гентамицин Вижън маз за очи може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Посочената честота означава: чести (може да засегнат до 1 на 10 души); редки (може да засегнат до 1 на 1000 души).

При лечение с продукта е възможна появата на следните нежелани реакции:

Нарушения на очите

Чести – сърбеж на клепачите, зачервяване на очите, сълзене;

Редки – очни алергични реакции, отделяне на секрет, чувство на дискомфорт в очите, подуване и зачервяване на клепача, бавно заздравяване на роговични рани.

Системни нарушения

Обикновено не се наблюдават реакции от страна на целия организъм.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +359 28903417

уебсайт: www.bda.bg

Като, съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Гентамицин Вижън

При температура под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се замразява!

Изхвърлете тубата 4 седмици след отварянето за да се избегнат евентуални инфекции и замърсявания.

Не използвайте Гентамицин Вижън след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Гентамицин Вижън:



- Активното вещество в 1 g маз за очи е : гентамицинов сулфат (*gentamicin as sulfate*), екв. на гентамицин (*gentamicin*) 3 mg
- Другите съставки са: метил парахидроксибензоат; пропил парахидроксибензоат; пречистена вода; ланолин; ларафин, бял мек (бял вазелин).

Как изглежда Гентамицин Вижън и какво съдържа опаковката:

Маз за очи.

Маз с еднородна консистенция без агломерати и въздушни мехури. Цвят - бял до бледожълт.

Лекарственият продукт е опакован в стерилни, алуминиеви туби с канюла, лакирани, с латексов пръстен в долния край, затворени с пластмасова капачка на винт снабдена с "tamper-evident" пръстен или пластмасова капачка на винт.

Една туба (5 g) заедно с листовка е поставена в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба

Антибиотик-Разград АД

бул. "Априлско въстание", № 68, офис 201

7200 Разград, България

Производител

Балканфарма-Разград АД

бул. "Априлско въстание", № 68

7200 Разград, България

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Антибиотик-Разград АД

бул. Априлско въстание, 68; Офис 201

7200, Разград, България

Дата на последно преразглеждане на листовката - Септември 2024

