

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Флексистад 400 mg филмирани таблетки
Flexistad 400 mg film-coated tablets

Флексистад 600 mg филмирани таблетки
Flexistad 600 mg film-coated tablets

Флексистад 800 mg филмирани таблетки
Flexistad 800 mg film-coated tablets

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН И СЪСТАВ

Флексистад 400 mg:

Всяка филмирана таблетка съдържа: 400 mg Ибупрофен (*Ibuprofen*).
Всяка филмирана таблетка съдържа 1,09 mg натрий.

Флексистад 600 mg:

Всяка филмирана таблетка съдържа: 600 mg Ибупрофен (*Ibuprofen*)
Всяка филмирана таблетка съдържа 1,64 mg натрий.

Флексистад 800 mg:

Всяка филмирана таблетка съдържа: 800 mg Иб

За симптоматично лечение на:

- леки до средно силни болки
- фебрилни състояния

4.2. Дозировка и начин на употреба

Дозировка:

За лечение на ревматични заболявания и посттравматични болезнени отоци и възпаление:

Флексистад се дозира в зависимост от телесното тегло и възрастта.

Препоръчителната доза за възрастни и деца над 15 години е между 1200 mg и 2400 mg

Флексистад дневно. Максималната еднократна доза е 800 mg ибупрофен.

Флексистад 400 mg

Юноши над 15 години и възрастни

Единична доза:

1 -2 филмирани таблетки Флексистад 400 mg (съответстваща на 400 mg -800 mg ибупрофен)

Днев

