

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Лордес 5 mg филмирани таблетки
Lordes 5 mg film-coated tablets
деслоратадин (*desloratadine*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Лордес и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Лордес
3. Как да приемате Лордес
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лордес
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	22130156
Разрешение №	И - 22502/12 06. 2013
Одобрение №	

1. Какво представлява Лордес и за какво се използва

Лордес е противоалергично лекарство, което не причинява сънливост. То помага за контролиране на алергичните реакции и техните симптоми им.

Лордес облекчава симптомите на алергичния ринит (възпаление на носните пътища, причинено от алергия, като например сенна хрема или алергия към домашен прах). Тези симптоми включват кихане, сърбеж и секреция от носа, сърбеж на небцето, сърбеж, зачервяване или насълзяване на очите.

Лордес се използва и за облекчаване симптомите на уртикария (състояние на кожата, причинено от алергия). Тези симптоми включват сърбеж и копривна треска. Облекчаването им продължава цял ден и Ви помага да възстановите нормалната си ежедневна активност и съня.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Лордес

Лордес е предназначен за възрастни и деца (над 12 години).

Не приемайте Лордес

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към деслоратадин или лоратадин, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Обърнете специално внимание при лечението с Лордес ако бъбречната Ви функция е влошена. Ако това се отнася за Вас или не сте сигурни, моля консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемете Лордес.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Лордес.



Други лекарства и Лордес

Не са известни взаимодействия между Лордес и други лекарства.

Лордес с храна и напитки

Лордес може да се приема с или без храна.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Препоръчаната доза Лордес не се очаква да предизвиква сънливост или влошаване на вниманието. Все пак, макар и много рядко, някои хора имат усещане за сънливост, което може да се отрази върху способността им за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Лордес

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза за е 1 (една) таблетка дневно. Приемете таблетката цяла, с вода, с или без храна.

Продължителност на курса на лечение

Вашият лекар ще определи вида на алергичния ринит, от който страдате, и в зависимост от това ще прецени колко време трябва да приемате Лордес.

- **Интермитентен алергичен ринит** (наличие на симптоми в продължение на по-малко от 4 дни седмично или в продължение на по-малко от 4 седмици).

Вашият лекар ще Ви препоръча схема на лечение, съобразена с данните за хода на болестта Ви.

- **Персистиращ алергичен ринит** (наличие на симптоми в продължение на 4 или повече дни седмично и в продължение на повече от 4 седмици).

Вашият лекар може да Ви препоръча по-продължително лечение.

- **Уртикария** - може да се налага различна продължителност на лечението и поради това трябва да спазвате препоръките на Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Лордес

Ако сте приели повече от необходимата доза Лордес, потърсете Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Лордес

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Приемете пропуснатата таблетка при първа възможност, след което продължете приема на Лордес по предписаната Ви схема.

Ако сте спрели приема на Лордес

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашият лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

В тази листовка, когато нежеланите реакции са описани като „чести“, това означава, че те са съобщавани при повече от 1 на всеки 100 пациента, но по-малко от 1 на всеки 10 пациента.

Когато нежеланите реакции са описани като „нечести“, това означава, че те са съобщавани при повече от 1 на всеки 1 000 пациента, но при по-малко от 1 на всеки 100 пациента.

Когато нежеланите реакции са описани като „редки“, това означава, че те са съобщавани при повече от 1 на всеки 10 000 пациента, но по-рядко от 1 на всеки 1 000 пациента.

Когато нежеланите реакции са описани като „много редки“, това означава, че те са съобщавани при по-малко от 1 на всеки 10 000 пациента.

Най-често наблюдаваните нежелани реакции при възрастни са: отпадналост, сухота в устата и главоболие.

При деца над 12 години най-често съобщаваната нежелана реакция е главоболие.

Много рядко се съобщава за тежки алергични реакции (затруднено дишане, хрипове, сърбеж, копривна треска и отоци).

За случаи на сърцебиене, ускорена сърдечна дейност, болки в корема, гадене (повдигане), повръщане, разстроен стомах, диария, виене на свят, сънливост, безсъние, болки в мускулите, халюцинации, гърчове, безпокойство със засилени движения, чернодробно възпаление и отклонения в чернодробните изследвания е съобщавано също много рядко.

5. Как да съхранявате Лордес

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Лордес

- Активното вещество е деслоратадин. Всяка таблетка съдържа 5 mg от активното вещество.

- Другите съставки са: калциев хидрогенфосфат дихидрат, микрокристална целулоза, царевично нишесте, талк, поли(винилов алкохол), макроголи, титанов диоксид (E 171), син алуминиев лак (E 132), железен оксид, жълт (E 172)

Как изглежда Лордес и какво съдържа опаковката

Сини, кръгли филмирани таблетки с надпис Nobel от едната страна, опаковани в блистери.

Размер на опаковките:

20 филмирани таблетки (2 блистера x10 филмирани таблетки в блистер)

30 филмирани таблетки (3 блистера x10 филмирани таблетки в блистер)

Други лекарствени форми, които можете да намерите на пазара:

Лордес 2,5 mg/5 ml сироп



Притежател на разрешението за употреба и производител

НОБЕЛ ФАРМА ЕООД
бул. Симеоновско шосе № 24
1700 София, България
тел.: +359 2 962 62 80
факс: +359 2 962 90 36
ел. поща: info@nobelpharma.bg

Дата на последно преразглеждане на листовката: 04/2013

