

## КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Приложение 1  
Към Рег. № 20190192/93/94/  
Разрешение № 20230114  
Всичко за МР 68623-6 24-04-2025

### 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Диперам НСТ 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки  
Диперам НСТ 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки  
Диперам НСТ 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки  
Диперам НСТ 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки

Dipperam НСТ 5 mg/160 mg/12.5 mg film-coated tablets  
Dipperam НСТ 10 mg/160 mg/12.5 mg film-coated tablets  
Dipperam НСТ 10 mg/160 mg/25 mg film-coated tablets  
Dipperam НСТ 10 mg/320 mg/25 mg film-coated tablets

### 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

#### Диперам НСТ 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg амлодипин (*amlodipine*) като амлодипинов безилат (*amlodipine besilate*), 160 mg валсартан (*valsartan*) и 12,5 mg хидрохлоротиазид (*hydrochlorothiazide*).

#### Диперам НСТ 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg амлодипин (*amlodipine*) като амлодипинов безилат (*amlodipine besilate*), 160 mg валсартан (*valsartan*) и 12,5 mg хидрохлоротиазид (*hydrochlorothiazide*).

#### Диперам НСТ 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg амлодипин (*amlodipine*) като амлодипинов безилат (*amlodipine besilate*), 160 mg валсартан (*valsartan*) и 25 mg хидрохлоротиазид (*hydrochlorothiazide*).

#### Диперам НСТ 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg амлодипин (*amlodipine*) като амлодипинов безилат (*amlodipine besilate*), 320 mg валсартан (*valsartan*) и 25 mg хидрохлоротиазид (*hydrochlorothiazide*).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

### 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

#### Диперам НСТ 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Бели, овални, двойноизпъкнали таблетки със скосени ръбове, с гравирани надписи "NVR" от едната страна и "VCL" от другата.

Дължина: приблизително 15 mm

Ширина: приблизително 5,9 mm

#### Диперам НСТ 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки

Бледожълти, овални, двойноизпъкнали таблетки със скосени ръбове, с гравирани надписи "NVR" от едната страна и "VDL" от другата.





Дължина: приблизително 15 mm  
Ширина: приблизително 5,9 mm

**Диперам НСТ 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки**

Кафяво-жълти, овални, двойноизпъкнали таблетки със скосени ръбове, с гравирани надписи "NVR" от едната страна и "VHL" от другата.

Дължина: приблизително 15 mm  
Ширина: приблизително 5,9 mm

**Диперам НСТ 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки**

Кафяво-жълти, овални, двойноизпъкнали таблетки със скосени ръбове, с гравирани надписи "NVR" от едната страна и "VFL" от другата.

Дължина: приблизително 19 mm  
Ширина: приблизително 7,5 mm

## 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

### 4.1 Терапевтични показания

Лечение на есенциална хипертония като заместителна терапия при възрастни пациенти, при които е постигнат задоволителен контрол върху артериалното налягане с комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (Hydrochlorothiazide, НСТ), прилагани като три отделни лекарствени форми или като фиксирана двойна комбинация и отделна лекарствена форма.

### 4.2 Дозировка и начин на приложение

#### Дозировка

Препоръчителната доза Диперам НСТ е една таблетка дневно, за предпочитане да се приема сутрин.

Преди да преминат на лечение с Диперам НСТ пациентите трябва да бъдат на фиксирани дози от съответните монокомпоненти, които приемат по същото време. Дозата на Диперам НСТ се определя на база дозите на отделните компоненти от комбинацията в момента на преминаването.

Максималната препоръчителна доза Диперам НСТ е 10 mg/320 mg/25 mg.

#### Специални популации

##### Бъбречно увреждане

Поради хидрохлоротиазидната компонента, Диперам НСТ е противопоказан при пациенти с анурия (вж. точка 4.3) и при пациенти с тежко бъбречно увреждане (скорост на гломерулна филтрация (Glomerular Filtration Rate, GFR)  $<30 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ ) (вж. точки 4.3, 4.4 и 5.2).

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане (вж. точки 4.4 и 5.2).

##### Чернодробно увреждане

Поради валсартановата компонента, Диперам НСТ е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане (вж. точка 4.3). При пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане без холестаза, максималната препоръчителна доза валсартан е 80 mg и поради тази причина Диперам НСТ не е подходящ при тази група пациенти (вж. точки 4.3, 4.4 и 5.2). Препоръки за дозата на амлодипин при пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане не





са установени. При преминаване на подходящи пациенти с хипертония (вж. точка 4.1) и чернодробно увреждане към лечение с Диперам НСТ, трябва да се използва най-ниската налична доза амлодипин.

#### *Сърдечна недостатъчност и коронарна болест на сърцето*

Съществува ограничен опит с употребата на амлодипин/валсартан/НСТ, особено в максимални дози, при пациенти със сърдечна недостатъчност и коронарна болест на сърцето. Препоръчва се повишено внимание при пациенти със сърдечна недостатъчност и коронарна болест на сърцето, особено при прилагане на максимална доза амлодипин/валсартан/НСТ, 10 mg/320 mg/25 mg.

#### *Старческа възраст (на възраст 65 години или повече)*

Препоръчва се повишено внимание, включително по-често мониториране на артериалното налягане, при пациенти в старческа възраст, особено при прилагане на максимална доза амлодипин/валсартан/НСТ, 10 mg/320 mg/25 mg, тъй като данните за употреба при тази пациентска популация са ограничени. При преминаване на подходящи пациенти в старческа възраст с хипертония (вж. точка 4.1) към лечение с Диперам НСТ, трябва да се използва най-ниската налична доза амлодипин.

#### *Педиатрична популация*

Диперам НСТ не се прилага в педиатричната популация (пациенти на възраст под 18 години) за показаното лечение на есенциална хипертония.

#### Начин на приложение

Перорално приложение.

Диперам НСТ може да се приема с или без храна.

Таблетките трябва да се поглъщат цели с малко количество вода, по едно и също време всеки ден, за предпочитане сутрин.

### **4.3 Противопоказания**

- Свръхчувствителност към активните вещества, други сулфонамидни производни, дихидропиридинови производни или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.
- Втори и трети триместър на бременността (вж. точки 4.4 и 4.6).
- Чернодробно увреждане, билиарна цироза или холестаза.
- Тежко бъбречно увреждане ( $GFR < 30 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ ), анурия и при пациенти на диализа.
- Едновременната употреба на Диперам НСТ с алискирен-съдържащи продукти е противопоказна при пациенти със захарен диабет или бъбречно увреждане ( $GFR < 60 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ ) (вж. точки 4.5 и 5.1).
- Рефракторна хипокалиемия, хипонатриемия, хиперкалциемия и симптоматична хиперурикемия.
- Тежка хипотония.
- Шок (включително кардиогенен шок).
- Обструкция на изхода на лява камера (напр. хипертрофична обструктивна кардиомиопатия и високостепенна аортна стеноза).
- Хемодинамично нестабилна сърдечна недостатъчност след остър миокарден инфаркт.

### **4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба**

Безопасността и ефикасността на амлодипин при хипертонична криза не са установени.

#### Пациенти с натриев- и/или обемен дефицит

Експресивна хипотония, включително ортостатична хипотония, се наблюдава при пациентите, лекувани с максималната доза амлодипин/валсартан/НСТ (10 mg/320 mg/25 mg) спрямо 1,8% при валсартан/хидрохлоротиазид (320 mg/25 mg), 0,4% при пациентите





амлодипин/валсартан (10 mg/320 mg) и 0,2% при пациентите на хидрохлоротиазид/амлодипин (25 mg/10 mg) в хода на контролирано изпитване при пациенти с умерена до тежка, неусложнена хипертония.

При пациенти с натриев и/или обемен дефицит, приемащи високи дози диуретици е възможно да възникне симптоматична хипотония след започване на лечението с амлодипин/валсартан/НСТ. Диперам НСТ трябва да се прилага само след коригиране на предшестващ натриев и/или обемен дефицит.

Ако при лечение с Диперам НСТ настъпи ексцесивна хипотония, пациентът трябва да бъде поставен в легнало положение и при необходимост да се приложи интравенозно инфузия с физиологичен разтвор. Лечението може да бъде продължено след като се стабилизира артериалното налягане.

#### Промени в серумните електролити

##### Амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид

В хода на контролираното клинично изпитване на амлодипин/валсартан/НСТ при много от пациентите противоположните ефекти на валсартан 320 mg и хидрохлоротиазид 25 mg върху нивата на серумния калий почти се неутрализират взаимно. При други пациенти, единият или другият ефект може да доминира. Периодично, на подходящи интервали от време, трябва да се изследват нивата на серумните електролити с цел откриване на възможни електролитни нарушения.

Периодично изследване на нивата на серумните електролити, по-специално на калия, трябва да се провежда на определени интервали от време с цел откриване на възможни електролитни нарушения, особено при пациенти с други рискови фактори като нарушена бъбречна функция, лечение с други лекарствени продукти или предхождаща анамнеза за електролитни нарушения.

##### Валсартан

Едновременната употреба с калиеви добавки, калий-съхраняващи диуретици, заместители на солта, съдържащи калий, или други лекарствени продукти, които биха могли да повишат нивата на калий (хепарин и т.н.), не се препоръчва. Стойностите на калия трябва съответно да се мониторират.

##### Хидрохлоротиазид

Лечение с Диперам НСТ трябва да се започне след коригиране на хипокалиемията и съпътстващата хипомагнезиемия. Тиазидните диуретици могат да ускорят нова поява на хипокалиемия или да обострят предшестваща хипокалиемия. Тиазидните диуретици трябва да се прилагат с повишено внимание при пациенти, чието състояние е свързано с повишена загуба на калий, като например сол губещи нефропатии или преренално (кардиогенно) увреждане на бъбречната функция. Ако по време на терапия с хидрохлоротиазид се развие хипокалиемия, приемът на Диперам НСТ трябва да се преустанови до стабилно възстановяване на баланса на калия.

Тиазидните диуретици могат да ускорят нова поява на хипонатриемия и хипохлоремична алкалоза или да обострят предшестваща хипонатриемия. Наблюдавана е хипонатриемия, съпроводена от неврологична симптоматика (гадене, прогресивна дезориентация, апатия). Лечението с хидрохлоротиазид може да се започне едва след корекция на съществуваща хипонатриемия. В случай на тежка или бързо развиваща се хипонатриемия по време на лечението с Диперам НСТ, лечението трябва да бъде спряно до нормализиране на нивата на натрия.

Всички пациенти, приемащи тиазидни диуретици трябва периодично да бъдат проследявани електролитни нарушения, особено на калия, натрия и магнезия.





### Бъбречно увреждане

Тиазидните диуретици могат да ускорят азотемията при пациенти с хронично бъбречно заболяване. Когато Диперам НСТ се прилага при пациенти с бъбречно увреждане, се препоръчва периодично проследяване на нивата на серумните електролити (включително на калия), креатинина и пикочната киселина. Диперам НСТ е противопоказан при пациенти с тежко бъбречно увреждане, анурия или провеждащи диализа (вж. точка 4.3).

Не се изисква коригиране на дозата на Диперам НСТ при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане ( $GFR \geq 30 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ ).

### Стеноза на бъбречна артерия

Диперам НСТ трябва да се прилага с повишено внимание за лечение на хипертония при пациенти с едностранна или двустранна стеноза на бъбречните артерии или при стеноза на артерия на единствен бъбрек, тъй като при такива пациенти може да получи повишаване на уреята в кръвта и серумния креатинин.

### Бъбречна трансплантация

До този момент няма натрупан опит по отношение на безопасната употреба на амлодипин/валсартан/НСТ при пациенти със скорошна бъбречна трансплантация.

### Чернодробно увреждане

Валсартан основно се елиминира непроменен чрез жлъчката. Полуживотът на амлодипин е удължен, а стойностите на AUC са по-високи при пациенти с нарушена чернодробна функция, не са установени препоръки за дозата. При пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане без холестаза максималната препоръчвана доза валсартан е 80 mg, следователно Диперам НСТ не е подходящ при тази група пациенти (вж. точки 4.2, 4.3 и 5.2).

### Ангиоедем

Съобщава се за случаи на ангиоедем, включително оток на ларинкса и глотиса, причиняващ обструкция на дихателните пътища и/или оток на лицето, устните, фаринкса и/или езика при пациенти, лекувани с валсартан. Някои от тези пациенти са имали и преди това ангиоедем, при лечение с други лекарствени продукти, включително ACE инхибитори. Диперам НСТ трябва да се спре незабавно при пациентите, които получат ангиоедем и не трябва да се прилага отново.

### Интестинален ангиоедем

За интестинален ангиоедем се съобщава при пациенти, лекувани с ангиотензин II рецепторни антагонисти, вкл. валсартан (вж. точка 4.8). Тези пациенти имат коремна болка, гадене, повръщане и диария. Симптомите отшумяват след преустановяване на ангиотензин II рецепторните антагонисти. Ако се диагностицира интестинален ангиоедем, лечението с валсартан трябва да се преустанови и да се започне подходящо наблюдение до пълното отшумяване на симптомите.

### Сърдечна недостатъчност и коронарна болест на сърцето/постмиокарден инфаркт

Като последица от инхибирането на ренин-ангиотензин-алдостероновата система при предразположени пациенти могат да се очакват промени в бъбречната функция. При пациенти с тежка сърдечна недостатъчност, чиято бъбречна функция би могла да зависи от активността на ренин-ангиотензин-алдостероновата система, лечението с ACE инхибитори и ангиотензин рецепторни блокери се свързва с олигурия и/или прогресивна азотемия и (рядко) с остра бъбречна недостатъчност и/или смърт. Подобни резултати са съобщени за валсартан. Оценката на пациентите със сърдечна недостатъчност или постмиокарден инфаркт трябва да включва винаги оценка на бъбречната функция.

В дългосрочно, плацебо-контролирано проучване (PRAISE-2, Prospective Randomized Amlodipine Survival Evaluation-2) с амлодипин при пациенти със сърдечна недостатъчност клас III и IV по NYHA (New York Heart Association Classification), с неischemична етиология





амлодипин се свързва с повишен брой съобщения за белодробен оток, въпреки липсата на значима разлика в честотата на влошаваща се сърдечна недостатъчност в сравнение с плацебо.

Блокерите на калциевите канали, включително амлодипин, трябва да се използват с повишено внимание при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност, тъй като могат да повишат риска от бъдещи сърдечно-съдови събития и смъртност.

Необходимо е повишено внимание при пациенти със сърдечна недостатъчност и коронарна болест на сърцето, особено при високата доза амлодипин/валсартан/НСТ, 10 mg/320 mg/25 mg, тъй като съществуващите данни при тази пациентска популация са ограничени.

#### Аортна и митрална клапна стеноза

Както при всички други вазодилататори е необходимо спазване на специални предпазни мерки при пациенти с митрална клапна стеноза или значима аортна стеноза, която не е високостепенна.

#### Бременност

Ангиотензин II рецепторните блокери (АПРБ) не трябва да се започват по време на бременност. Освен ако продължаването на терапията с АПРБ се счита за жизнено важно, на пациентките, които планират да забременеят, трябва да бъде назначено алтернативно антихипертензивно лечение с установен профил на безопасност за употреба по време на бременност. При установяване на бременност лечението с АПРБ трябва да се преустанови незабавно и, ако е уместно, да се започне алтернативна терапия (вж. точки 4.3 и 4.6).

#### Първичен хипералдостеронизъм

Пациенти с първичен хипералдостеронизъм не трябва да бъдат лекувани с ангиотензин II рецепторния блокер валсартан, тъй като тяхната ренин-ангиотензин-алдостеронова система не е активирана. Поради тази причина Диперам НСТ не се препоръчва при тази популация.

#### Системен лупус еритематозус

Съобщава се, че тиазидните диуретици, включително хидрохлоротиазид, могат да обострят или да активират системен лупус еритематодес.

#### Други метаболитни нарушения

Тиазидните диуретици, включително хидрохлоротиазид, могат да нарушат глюкозния толеранс и да повишат серумните нива на холестерол, триглицериди и пикочна киселина. При пациенти с диабет може да е необходимо коригиране на дозата на инсулина или на пероралното хипогликемично средство.

Поради хидрохлоротиазидната компонента Диперам НСТ е противопоказан при симптоматична хиперурикемия. Хидрохлоротиазид може да повиши серумните нива на пикочната киселина, поради намаления клирънс на пикочната киселина и може да причини или да обостри хиперурикемията, както и да ускори появата на подагра при предразположени пациенти.

Тиазидите намаляват екскрецията на калций с урината и могат да предизвикат преходно и леко покачване на серумния калций при липсата на известни нарушения в калциевия метаболизъм. Диперам НСТ е противопоказан при пациенти с хиперкалциемия и трябва да се прилага само след коригиране на предшестваща хиперкалциемия. Приемът на Диперам НСТ трябва да бъде прекратен при развитие на хиперкалциемия по време на лечението. Серумните нива на калция трябва периодично да се проверяват по време на лечението с тиазиди. Подчертаната хиперкалциемия може да бъде доказателство за скрит хиперпаратиреоидизъм. Приемът на тиазидни диуретици трябва да бъде прекратен преди провеждане на изследвания на паратиреоидните жлези.





### Фоточувствителност

Съобщава се за случаи на реакции на фоточувствителност при прием на тиазидните диуретици (вж. точка 4.8). Ако по време на лечението с Диперам НСТ възникне реакция на фоточувствителност, се препоръчва спиране на лечението. Ако се счита за необходимо повторно прилагане на диуретика, се препоръчва защита на областите, изложени на слънце или изкуствена UVA светлина.

### Хороидален излив, остра миопия и остра закритоъгълна глаукома:

Сулфонамидите или лекарствата, производни на сулфонамидите, могат да предизвикат идиосинкратична реакция, водеща до хороидален излив с дефект на зрителното поле, остра преходна миопия и остра закритоъгълна глаукома. Симптомите включват внезапно намаляване на зрителната острота или болка в очите и обичайно възникват в рамките на часове до седмици след започване на лечението. Нелекуваната остра закритоъгълна глаукома може да доведе до перманентна загуба на зрението.

Първоначалното лечение е да се прекрати приема на хидрохлоротиазид, колкото се може по-бързо. Ако не се постигне контрол върху вътреочното налягане трябва да се имат предвид своевременно медицинско или хирургично лечение. Рисковите фактори за развитие на остра закритоъгълна глаукома могат да включват анамнеза за сулфонамидна или пеницилинова алергия.

### Общи

Необходимо е повишено внимание при пациенти с предшестваща свръхчувствителност към други ангиотензин II рецепторни блокери. Реакциите на свръхчувствителност към хидрохлоротиазид са по-вероятни при пациенти, страдащи от алергия или астма.

### Старческа възраст (на възраст 65 години или повече)

Препоръчва се повишено внимание, включително по-често мониториране на артериалното налягане, при пациенти в старческа възраст, особено при прилагане на максималната доза амлодипин/валсартан/НСТ, 10 mg/320 mg/25 mg, тъй като данните за употреба при тази пациентска популация са ограничени.

### Двойно блокиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС)

Има данни, че едновременната употреба на АСЕ инхибитори, ангиотензин-рецепторни блокери (АРБ) или алискирен повишава риска от хипотония, хиперкалиемия и намаляване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Поради това не се препоръчва двойно блокиране на РААС чрез комбинираната употреба на АСЕ инхибитори, АРБ или алискирен (вж. точки 4.5 и 5.1).

Ако се прецени, че терапията с двойно блокиране е абсолютно необходима, това трябва да става само под наблюдението на специалист и при често внимателно мониториране на бъбречната функция, електролитите и кръвното налягане. АСЕ инхибитори и АРБ не трябва да се използват едновременно при пациенти с диабетна нефропатия.

### Немеланомен рак на кожата

В две епидемиологични проучвания, основаващи се на датския национален раков регистър, е наблюдаван повишен риск от немеланомен рак на кожата (НМРК) [базалноклетъчен карцином (БКК) и сквамозноклетъчен карцином (СКК)] при нарастваща експозиция на кумулативна доза хидрохлоротиазид. Фотосенсибилизиращите ефекти на хидрохлоротиазид могат да действат като вероятен механизъм за развитие на НМРК.

Пациентите, приемащи хидрохлоротиазид, трябва да бъдат информирани за риска от НМРК и съветвани редовно да проверяват кожата си за нови лезии и незабавно да съобщават за появата на подозрителни кожни лезии. На пациентите трябва да се препоръчат възможни превантивни мерки, като ограничено излагане на слънчева светлина и ултравиолетови лъчения.





експозиция, подходяща защита, за да се сведе до минимум рискът от рак на кожата. Подозрителните кожни лезии трябва да бъдат подложени на незабавно изследване, потенциално включващо хистологични изследвания на биопсични материали. Преразглеждане на употребата на хидрохлоротиазид може да се наложи и при пациенти, които са имали предходен НМРК (вж. също точка 4.8).

#### Остра респираторна токсичност

След прием на хидрохлоротиазид се съобщават много редки тежки случаи на остра респираторна токсичност, включително остър респираторен дистрес синдром (ОРДС). След прием на хидрохлоротиазид обикновено се развива белодробен оток в рамките на минути до часове. В началото симптомите включват диспнея, повишена температура, влошаване на белодробната функция и хипотония. При съмнение за ОРДС трябва да бъде спряна приемът на Диперам НСТ и да се приложи подходящо лечение. Хидрохлоротиазид не трябва да се прилага при пациенти, които преди това са получавали ОРДС след прием на хидрохлоротиазид.

#### **4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие**

Не са провеждани официални проучвания за взаимодействия на амлодипин/валсартан/НСТ с други лекарствени продукти. Следователно, в тази точка е представена информация единствено за известните при отделните активни вещества взаимодействия с други лекарствени продукти.

Важно е да се има предвид, че амлодипин/валсартан/НСТ може да засили хипотензивните ефекти на други антихипертензивни средства.

#### Не се препоръчва едновременно приложение

| Активно(и) вещество(а) | Известни взаимодействия със следните средства                                                                                                | Ефект на взаимодействието с други лекарствени продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Валсартан и НСТ        | Литий                                                                                                                                        | Съобщава се за обратимо повишаване на концентрацията на литий в серума и токсичност при едновременно прилагане на литий с АСЕ инхибитори, ангиотензин II рецепторни антагонисти, включително валсартан или тиазидни диуретици. Тъй като бъбречният клирънс на лития е намален от тиазидите, рискът от литиева токсичност е възможно допълнително да се повиши при прием на Диперам НСТ. Поради тази причина се препоръчва внимателно проследяване на серумните нива на литий при едновременна употреба. |
| Валсартан              | Калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий и други вещества, които могат да повишат нивата на калий | Ако се сметне за необходимо едновременно с валсартан да се предпише лекарствен продукт, който повлиява нивата на калий, се препоръчва често мониториране на плазмените нива на калий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Амлодипин              | Грейпфрут или сок от грейпфрут                                                                                                               | Не се препоръчва едновременната употреба на амлодипин с грейпфрут или сок от грейпфрут, тъй като при някои пациенти бионаличността на амлодипин може да се повиши и да доведе до засилване на антихипертензивните ефекти.                                                                                                                                                                                                                                                                               |





Изисква се повишено внимание при едновременно приложение

| Активно(и) вещество(а) | Известни взаимодействия със следните средства                                                                                                                                     | Ефект на взаимодействието с други лекарствени продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Амлодипин              | <i>CYP3A4</i> инхибитори (напр. кетоконазол, итраконазол, ритонавир)                                                                                                              | Едновременното приложение на амлодипин със силни или умерени <i>CYP3A4</i> инхибитори (протеазни инхибитори, азолни противогъбични средства, макролиди, като еритромицин или кларитромицин, верапамил или дилтиазем), може да доведе до значимо увеличаване на експозицията на амлодипин. Клиничната значимост на тези фармакокинетични вариации може да е по-изразена при пациентите в старческа възраст. Това може да наложи клинично проследяване и корекция на дозата. |
|                        | <i>CYP3A4</i> индуктори (антиконвулсанти [напр. карбамазепин, фенobarбитал, фенитоин, фосфенитоин, примидон], рифампицин, <i>Hypericum perforatum</i> [жълт кантарион])           | При едновременно приложение на известни индуктори на <i>CYP3A4</i> , плазмената концентрация на амлодипин може да варира. Поради това кръвното налягане трябва да се проследява и да се обмисли адаптиране на дозата както по време, така и след едновременен прием, особено със силни <i>CYP3A4</i> индуктори (напр. рифампицин, жълт кантарион).                                                                                                                         |
|                        | Симвастатин                                                                                                                                                                       | Многократното приложение на амлодипин 10 mg едновременно със симвастатин 80 mg повишава със 77% експозицията на симвастатин спрямо самостоятелното приложение на симвастатин. Препоръчва се намаляване на дозата на симвастатин до 20 mg дневно при пациентите на лечение с амлодипин.                                                                                                                                                                                     |
|                        | Дантролен (инфузия)                                                                                                                                                               | При животни са наблюдавани летална камерна фибрилация и сърдечно-съдов колапс, свързани с хиперкалиемия след приложение на верапамил и интравенозен дантролен. Поради риск от хиперкалиемия, се препоръчва да се избягва едновременното приложение с антагонисти на калциевите канали като амлодипин при пациенти, предразположени към малигнена хипертермия и при овладяване на малигнена хипертермия.                                                                    |
| Валсартан и НСТ        | Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), включващи селективни циклооксигеназа-2 инхибитори (COX-2 инхибитори), ацетилсалицилова киселина (>3 g/ден) и неселективни НСПВС | НСПВС могат да отслабят антихипертензивния ефект, както на ангиотензин II рецепторните блокери, така и на хидрохлоротиазид, когато се прилагат едновременно. Освен това едновременната употреба на Диперам НСТ и НСПВС може да доведе до влошаване на бъбречната функция, и повишаване на нивата на серумния калий. Поради тази причина се препоръчва мониториране на бъбречната функция при започване на лечението, както и адекватна хидратация на пациента.             |





| Активно(и) вещество(а) | Известни взаимодействия със следните средства                                                            | Ефект на взаимодействието с други лекарствени продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Валсартан              | Инхибитори на <i>ъптейк</i> транспортера (рифампицин, циклоспорин) или ефлуксния транспортер (ритонавир) | Резултатите от <i>in vitro</i> проучване с тъкан от човешки черен дроб показва, че валсартан е субстрат на чернодробния <i>ъптейк</i> транспортер OATP1B1 и на чернодробния ефлуксен транспортер MRP2. Едновременното приложение с инхибитори на <i>ъптейк</i> транспортера (рифампицин, циклоспорин) или на ефлуксния транспортер (ритонавир) може да повиши системната експозиция на валсартан. |
| НСТ                    | Алкохол, барбитурати или наркотици                                                                       | Едновременното прилагане на тиазидните диуретици с вещества, които също имат понижаващ кръвното налягане ефект (напр. чрез намаляване на активността на централната нервна система или директна вазодилатация) може да потенцира появата на ортостатична хипотония.                                                                                                                               |
|                        | Амантадин                                                                                                | Тиазидите, включително хидрохлоротиазид, могат да повишат риска от нежелани реакции, причинени от амантадин.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | Антихолинергични средства и други лекарствени продукти, повлияващи стомашния мотилитет                   | Бионаличността на тиазидните диуретици може да се повиши от антихолинергичните средства (напр. атропин, бипериден), вероятно поради намаляване на мотилитета на стомашно-чревния тракт и забавяне на времето за изпразване на стомаха. Обратно, очаква се прокинетиците вещества като цизарпид да могат да намалят бионаличността на тиазидните диуретици.                                        |
|                        | Антидиабетни средства (напр. инсулин и перорални антидиабетни средства)<br>– Метформин                   | Тиазидите могат да нарушат глюкозния толеранс. Може да се наложи коригиране на дозите на антидиабетните лекарствени продукти.<br><br>Метформин трябва да се приема с повишено внимание поради риск от лактатна ацидоза, индуцирана от възможна функционална бъбречна недостатъчност, свързана с хидрохлоротиазид.                                                                                 |
|                        | Бета-блокери и диазоксид                                                                                 | Едновременното приложение на тиазидни диуретици, включително хидрохлоротиазид, и бета-блокери може да повиши риска от хипергликемия. Тиазидните диуретици, включително хидрохлоротиазид, могат да повишат хипергликемичния ефект на диазоксид.                                                                                                                                                    |
|                        | Циклоспорин                                                                                              | Едновременното прилагане с циклоспорин може да повиши риска от хиперурикемия и усложнения на подаграта.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | Цитотоксични средства                                                                                    | Тиазидите, включително хидрохлоротиазид, могат да намалят бъбречната екскреция на цитотоксичните средства (напр. циклофосфамид, метотрексат) и да потенцират техните миелосупресивни ефекти.                                                                                                                                                                                                      |
|                        | Дигиталисови гликозиди                                                                                   | Тиазид-индуцирана хипокалиемия или хипомагнезиемия могат да се изявят като нежелани реакции, улеснявайки началото на дигиталис-индуцирани сърдечни аритмии.                                                                                                                                                                                                                                       |





| Активно(и) вещество(а) | Известни взаимодействия със следните средства                                                         | Ефект на взаимодействието с други лекарствени продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <i>Йодни контрастни вещества</i>                                                                      | В случай на диуретик-индуцирана дехидратация има повишен риск от остра бъбречна недостатъчност, особено при високи дози на йодните продукти. Пациентите трябва да се рехидратират преди прилагането на йодни контрастни вещества.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | <i>Йоннообменни смоли</i>                                                                             | Абсорбцията на тиазидните диуретици, включително хидрохлоротиазид, се намалява от холестирамин или холестипол. Това може да доведе до субтерапевтични ефекти на тиазидните диуретици. Въпреки това, прилагането на хидрохлоротиазид и на смоли поотделно, така че хидрохлоротиазид да се прилага поне 4 часа преди или 4-6 часа след приложението на йонообменната смола, би намалило взаимодействието.                                                                     |
|                        | <i>Лекарствени продукти, повлияващи серумното ниво на калия</i>                                       | Хипокалиемичните ефекти на хидрохлоротиазид могат да бъдат повишени при съвместно приложение с калий-губещи диуретици, кортикостероиди, лаксативи, адренекортикотропен хормон (АСТН), амфотерицин, карбеноксолон, пеницилин G и производни на салициловата киселина или антиаритмици. Ако е необходимо предписването на тези лекарствени продукти едновременно с комбинацията амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид, се препоръчва мониториране на плазмените нива на калия. |
|                        | <i>Лекарствени продукти, повлияващи серумното ниво на натрия</i>                                      | Хипонатриемичният ефект на диуретиците може да се усили при съвместно приложение с определени лекарствени продукти като антидепресанти, антипсихотици, антиепилептични средства и др. Необходимо е повишено внимание при съвместно приложение на тези лекарствени продукти.                                                                                                                                                                                                 |
|                        | <i>Лекарствени продукти, които могат да индуцират torsades de pointes</i>                             | Поради риска от хипокалиемия хидрохлоротиазид трябва да се прилага с повишено внимание с продукти, които могат да индуцират <i>torsades de pointes</i> , по-специално антиаритмици Клас Ia и Клас III, както и някои антипсихотици.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | <i>Лекарствени продукти, прилагани за лечение на подагра (пробенецид, сулфинпиразон и алопуринол)</i> | Възможно е да се наложи коригиране на дозата на урикозуричните лекарствени продукти, тъй като хидрохлоротиазид може да покачи нивата на серумната пикочна киселина. Може и да е необходимо да се увеличи дозата на пробенецид и сулфинпиразон. Едновременното прилагане на тиазидни диуретици, включително хидрохлоротиазид, може да повиши честотата на реакциите на свръхчувствителност спрямо алопуринол.                                                                |
|                        | <i>Метилдопа</i>                                                                                      | Има отделни съобщения за случаи на хемолитична анемия, възникнала при едновременно прилагане на хидрохлоротиазид и метилдопа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | <i>Недеполяризиращи скелетно-мускулни релаксанти (напр. тубокурарин)</i>                              | Тиазидите, включително хидрохлоротиазид, потенцират действието на производните на тубокурарин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





| Активно(и) вещество(а) | Известни взаимодействия със следните средства         | Ефект на взаимодействието с други лекарствени продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <i>Други антихипертензивни лекарствени продукти</i>   | Тиазидите потенцират антихипертензивното действие на другите антихипертензивни лекарствени продукти (напр. гуанетидин, метилдопа, бета блокери, вазодилататори, блокери на калциевите канали, АСЕ инхибитори, АРБ и Директни Ренинови Инхибитори [ДРИ]).                                                                                                                                                                        |
|                        | <i>Пресорни амини (напр. норадреналин, адреналин)</i> | Хидрохлоротиазид може да намали отговора към пресорни амини като норадреналин. Клиничната значимост на този ефект е неопределена и не е достатъчна за прекратяване на тяхната употреба.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | <i>Витамин D и калциеви соли</i>                      | Прилагането на тиазидни диуретици, включително хидрохлоротиазид, с витамин D или с калциеви соли може да потенцира покачването на серумния калций. Едновременното приложение с тиазидни диуретици може да доведе до хиперкалциемия при пациенти предразположени към хиперкалциемия (напр. хиперпаратиреоидизъм, злокачествени заболявания или витамин D-медиирани състояния) чрез повишаване на тубулната калциева реабсорбция. |

#### Двойно блокиране на РААС с АРБ, АСЕ инхибитори или алискирен

Данни от клинични проучвания показват, че двойното блокиране на РААС чрез комбинираната употреба на АСЕ инхибитори, АРБ или алискирен се свързва с по-висока честота на нежелани събития, като например хипотония, хиперкалиемия и намаляване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност), в сравнение с употребата само на едно средство, действащо върху РААС (вж. точка 4.3, 4.4 и 5.1).

## 4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

### Бременност

#### Амлодипин

Безопасността на амлодипин по време на бременност при хора не е установена. В проучвания при животни, при високи дози е наблюдавана репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Приложение по време на бременност се препоръчва само когато няма по-безопасна алтернатива и когато болестта сама по себе си носи по-голям риск за майката и плода.

#### Валсартан

Употребата на ангиотензин II рецепторни блокери (АПРБ) не се препоръчва по време на първия триместър на бременността (вж. точка 4.4). Употребата на АПРБ е противопоказана по време на втория и третия триместър от бременността (вж. точки 4.3 и 4.4).

Епидемиологичните данни за риска от тератогенност след експозиция на АСЕ инхибитори по време на първия триместър от бременността не водят до окончателни заключения. Все пак, леко повишение на риска не може да се изключи. Въпреки че няма данни от контролирани епидемиологични проучвания за риска при ангиотензин II рецепторните блокери (АПРБ) подобен риск може да съществува за този клас лекарствени продукти. Освен ако продължаването на АПРБ терапията се сметне за жизнено важно, пациентките планиращи бременност трябва да преминат на алтернативно антихипертензивно лечение, което има установен профил на безопасност при бременност. Ако се установи бременност, лечението АПРБ трябва да се преустанови незабавно и, ако е уместно, да се започне алтернативна терапия.





Експозицията на АПРБ по време на втория и третия триместър на бременността може да доведе до фетотоксичност (намаление на бъбречната функция, олигохидрамнион, забавена осификация на черепа) и неонатална токсичност (бъбречна недостатъчност, хипотония, хиперкалиемия) (вж. точка 5.3).

В случай че се установи експозиция на АПРБ от втория триместър на бременността, се препоръчва проверка на бъбречната функция и черепа на плода чрез ултразвук.

Новородени, чиито майки са приемали АПРБ, трябва внимателно да бъдат наблюдавани за хипотония (вж. точки 4.3 и 4.4).

#### Хидрохлоротиазид

Има ограничен опит относно употребата на хидрохлоротиазид по време на бременност, особено през първия триместър. Проучванията при животни са недостатъчни.

Хидрохлоротиазид преминава през плацентата. Въз основа на фармакологичния механизъм на действие на хидрохлоротиазид, употребата му през втория и третия триместър може да наруши фетоплацентарната перфузия и да доведе до фетални и неонатални ефекти като жълтеница, нарушения на електролитния баланс и тромбоцитопения.

#### Амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид

Липсва опит с употребата на амлодипин/валсартан/НСТ при бременни. Въз основа на съществуващите данни от проучвания с отделните компоненти, употребата на Диперам НСТ не се препоръчва през първия триместър от бременността и е противопоказана през втория и третия триместър от бременността (вж. точки 4.3 и 4.4).

#### Кърмене

Липсват данни относно употребата на валсартан по време на кърмене. Амлодипин се екскретира в кърмата при хора. Частта от дозата на майката, получена от кърмачето, е изчислена с интерквартилен диапазон 3 – 7%, с максимум 15%. Ефектът на амлодипин върху кърмачетата е неизвестна. Хидрохлоротиазид се екскретира в кърмата в малки количества. Във високи дози тиазидите предизвикват интензивна диуреза и могат да потиснат образуването на кърмата. Употребата на Диперам НСТ не се препоръчва по време на кърмене. Ако Диперам НСТ се използва по време на кърмене, дозите трябва да бъдат колкото се може по-ниски. Предпочита се алтернативна терапия с установен профил на безопасност по време на кърмене, особено при кърмене на новородени и преждевременно родени деца.

#### Фертилитет

Няма клинични проучвания относно влиянието амлодипин/валсартан/НСТ върху фертилитета.

#### Валсартан

Валсартан няма нежелани ефекти върху репродуктивната способност на мъжки и женски плъхове при прием на перорални дози до 200 mg/kg/ден. Тази доза е 6 пъти максималната препоръчителна доза при хора, определена на база mg/m<sup>2</sup> (изчислението е за перорална доза от 320 mg/ден и 60-килограмов пациент).

#### Амлодипин

При някои пациенти, лекувани с блокери на калциевите канали, са съобщени обратими биохимични промени в главичката на сперматозоидите. Клиничните данни са недостатъчни по отношение на потенциалния ефект на амлодипин върху фертилитета. При едно проучване при плъхове са установени нежелани ефекти върху фертилитета при мъжките (вж. точка 5.3).

### **4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Пациентите, които приемат Диперам НСТ и шофират или работят с машини трябва да имат





предвид, че понякога е възможно да се появят умора и замаяване.

Амлодипин може да повлияе в слаба до умерена степен способността за шофиране и работа с машини. Ако пациентите, приемащи Диперам НСТ, получат замаяване, главоболие, умора или гадене, способността им да реагират може да бъде нарушена.

#### 4.8 Нежелани лекарствени реакции

Профилът на безопасността на амлодипин/валсартан/НСТ, представен по-долу се основава на клинични проучвания, проведени с амлодипин/валсартан/НСТ и познатите профили на безопасност на отделните компоненти амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид.

##### Обобщение на профила на безопасност

Безопасността на амлодипин/валсартан/НСТ е оценена при неговата максимална доза 10 mg/320 mg/25 mg в хода на едно контролирано краткосрочно (8 седмици) клинично проучване с 2271 пациенти, 582 от които приемат валсартан в комбинация с амлодипин и хидрохлоротиазид. Нежеланите реакции като цяло са били леки и преходни по характер и само в редки случаи са налагали преустановяване на лечението. По време на това активно контролирано клинично изпитване най-честите причини за преустановяване на лечението с амлодипин/валсартан/НСТ са били замаяност и хипотония (0,7%).

По време на 8-седмичното контролирано клинично проучване не са наблюдавани значими нови или неочаквани нежелани лекарствени реакции в сравнение с известните при монотерапия или двойно-комбинирана терапия с отделните компоненти.

По време на 8-седмичното контролиране клинично проучване наблюдаваните при комбинацията амлодипин/валсартан/НСТ промени в лабораторните показатели са били минимални и в съответствие с фармакологичния механизъм на действие на отделните компоненти. Наличието на валсартан в тройната комбинация отслабва хипокалиемичния ефект на хидрохлоротиазид.

##### Табличен списък на нежеланите реакции

Следващите нежелани реакции, изброени според системно-органи класове по MedDRA и честота, се отнасят за амлодипин/валсартан/НСТ и поотделно за амлодипин, валсартан и НСТ. Много чести:  $\geq 1/10$ ; чести:  $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ; нечести:  $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ ; редки:  $\geq 1/10\,000$  до  $< 1/1000$ ; много редки:  $< 1/10\,000$ , с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

| MedDRA<br>системо-органи<br>класове                                                            | Нежелани реакции                                                                               | Честота                         |           |           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                | амлодипин/<br>валсартан/<br>НСТ | амлодипин | валсартан | НСТ                        |
| Неоплазми –<br>доброкачествени,<br>злокачествени и<br>неопределени<br>(вкл. кисти и<br>полипи) | Немеланомен рак на<br>кожата<br>(базалноклетъчен<br>карцином<br>сквамозноклетъчен<br>карцином) | --                              | --        | --        | С<br>неизвестна<br>честота |





| MedDRA<br>системо-органични<br>класове       | Нежелани реакции                                    | Честота                         |                |                            |                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
|                                              |                                                     | амлодипин/<br>валсартан/<br>НСТ | амлодипин      | валсартан                  | НСТ                        |
| Нарушения на<br>кръвта и<br>лимфната система | Агранулоцитоза,<br>костно-мозъчна<br>недостатъчност | --                              | --             | --                         | Много<br>редки             |
|                                              | Понижен хемоглобин и<br>хематокрит                  | --                              | --             | С<br>неизвестна<br>честота | --                         |
|                                              | Хемолитична анемия                                  | --                              | --             | --                         | Много<br>редки             |
|                                              | Левкопения                                          | --                              | Много<br>редки | --                         | Много<br>редки             |
|                                              | Неутропения                                         | --                              | --             | С<br>неизвестна<br>честота | --                         |
|                                              | Тромбоцитопения,<br>понякога с пурпура              | --                              | Много<br>редки | С<br>неизвестна<br>честота | Редки                      |
|                                              | Апластична анемия                                   | --                              | --             | --                         | С<br>неизвестна<br>честота |
| Нарушения на<br>имунната система             | Свръхчувствителност                                 | --                              | Много<br>редки | С<br>неизвестна<br>честота | Много<br>редки             |
| Нарушения на<br>метаболизма и<br>храненето   | Анорексия                                           | Нечести                         | —              | --                         | --                         |
|                                              | Хиперкалциемия                                      | Нечести                         | --             | --                         | Редки                      |
|                                              | Хипергликемия                                       | --                              | Много<br>редки | --                         | Редки                      |
|                                              | Хиперлипидемия                                      | Нечести                         | --             | --                         | --                         |
|                                              | Хиперурикемия                                       | Нечести                         | --             | --                         | Чести                      |
|                                              | Хипохлоремична<br>алкалоза                          | --                              | --             | --                         | Много<br>редки             |
|                                              | Хипокалиемия                                        | Чести                           | --             | --                         | Много<br>чести             |
|                                              | Хипомагниезия                                       | --                              | --             | --                         | Чести                      |
|                                              | Хипонатриемия                                       | Нечести                         | --             | --                         | Чести                      |
|                                              | Влошаване на диабета                                | --                              | --             | --                         | Редки                      |
| Психични<br>нарушения                        | Депресия                                            | --                              | Нечести        | --                         | Редки                      |
|                                              | Инсомния/нарушения на<br>съня                       | Нечести                         | Нечести        | --                         | Редки                      |
|                                              | Промени в настроението                              | --                              | Нечести        | --                         | --                         |
|                                              | Обърканост                                          | --                              | Редки          | --                         | --                         |





| MedDRA<br>системо-органични<br>класове | Нежелани реакции                                                                    | Честота                         |                            |                            |                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                        |                                                                                     | амлодипин/<br>валсартан/<br>НСТ | амлодипин                  | валсартан                  | НСТ                        |
| Нарушения на<br>нервната система       | Координационни<br>нарушения                                                         | Нечести                         | --                         | --                         | --                         |
|                                        | Замаяност                                                                           | Чести                           | Чести                      | --                         | Редки                      |
|                                        | Постурална замаяност,<br>замаяност при усилие                                       | Нечести                         | --                         | --                         | --                         |
|                                        | Дисгеузия                                                                           | Нечести                         | Нечести                    | --                         | --                         |
|                                        | Екстрапирамидна<br>симптоматика                                                     | --                              | С<br>неизвестна<br>честота | --                         | --                         |
|                                        | Главоболие                                                                          | Чести                           | Чести                      | --                         | Редки                      |
|                                        | Повишен мускулен<br>тонус                                                           | --                              | Много<br>редки             | --                         | --                         |
|                                        | Летаргия                                                                            | Нечести                         | --                         | --                         | --                         |
|                                        | Парестезии                                                                          | Нечести                         | Нечести                    | --                         | Редки                      |
|                                        | Периферна невропатия,<br>невропатия                                                 | Нечести                         | Много<br>редки             | --                         | --                         |
|                                        | Сомнолентност                                                                       | Нечести                         | Чести                      | --                         | --                         |
|                                        | Синкоп                                                                              | Нечести                         | Нечести                    | --                         | --                         |
|                                        | Тремор                                                                              | --                              | Нечести                    | --                         | --                         |
|                                        | Хипоестезия                                                                         | --                              | Нечести                    | --                         | --                         |
| Нарушения на<br>очите                  | Остра закритоъгълна<br>глаукома                                                     | --                              | --                         | --                         | С<br>неизвестна<br>честота |
|                                        | Зрителни нарушения                                                                  | --                              | Нечести                    | --                         | --                         |
|                                        | Зрително увреждане                                                                  | Нечести                         | Нечести                    | --                         | Редки                      |
|                                        | Хороидален излив                                                                    |                                 |                            |                            | С<br>неизвестна<br>честота |
| Нарушения на<br>ухото и<br>лабиринта   | Шум в ушите                                                                         | --                              | Нечести                    | --                         | --                         |
|                                        | Световъртеж                                                                         | Нечести                         | --                         | Нечести                    | --                         |
| Сърдечни<br>нарушения                  | Палпитации                                                                          | --                              | Чести                      | --                         | --                         |
|                                        | Тахикардия                                                                          | Нечести                         | --                         | --                         | --                         |
|                                        | Аритмии (включително<br>брадикардия, камерна<br>тахикардия и<br>предсърдно мъждене) | --                              | Много<br>редки             | --                         | Редки                      |
|                                        | Миокарден инфаркт                                                                   | --                              | Много<br>редки             | --                         | --                         |
| Съдови<br>нарушения                    | Почервявяване                                                                       | --                              | Чести                      | --                         | --                         |
|                                        | Хипотония                                                                           | Чести                           | Нечести                    | --                         | --                         |
|                                        | Ортостатична<br>хипотония                                                           | Нечести                         | --                         | --                         | Чести                      |
|                                        | Флебит, тромбофлебит                                                                | Нечести                         | --                         | --                         | --                         |
|                                        | Васкулит                                                                            | --                              | Много<br>редки             | С<br>неизвестна<br>честота | --                         |





| MedDRA<br>системо-органични<br>класове                  | Нежелани реакции                                                                                                   | Честота                         |                  |                            |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|                                                         |                                                                                                                    | амлодипин/<br>валсартан/<br>НСТ | амлодипин        | валсартан                  | НСТ            |
| Респираторни,<br>гърдни и<br>медиастинални<br>нарушения | Кашлица                                                                                                            | Нечести                         | Много<br>редки   | Нечести                    | --             |
|                                                         | Диспнея                                                                                                            | Нечести                         | Нечести          | --                         | --             |
|                                                         | Респираторен дистрес,<br>белодробен оток,<br>пневмонит                                                             | --                              | --               | --                         | Много<br>редки |
|                                                         | Остър респираторен<br>дистрес синдром<br>(ОРДС) (вж. точка 4.4)                                                    | --                              | --               | --                         | Много<br>редки |
|                                                         | Ринит                                                                                                              | --                              | Нечести          | --                         | --             |
|                                                         | Възпалено гърло                                                                                                    | Нечести                         | --               | --                         | --             |
| Стомашно-чревни<br>нарушения                            | Стомашен дискомфорт,<br>болка в горната част на<br>корема                                                          | Нечести                         | Чести            | Нечести                    | Редки          |
|                                                         | Лош дъх                                                                                                            | Нечести                         | --               | --                         | --             |
|                                                         | Промени в чревната<br>перисталтика                                                                                 | --                              | Нечести          | --                         | --             |
|                                                         | Запек                                                                                                              | --                              | --               | --                         | Редки          |
|                                                         | Понижен апетит                                                                                                     | --                              | --               | --                         | Чести          |
|                                                         | Диария                                                                                                             | Нечести                         | Нечести          | --                         | Редки          |
|                                                         | Сухота в устата                                                                                                    | Нечести                         | Нечести          | --                         | --             |
|                                                         | Диспепсия                                                                                                          | Чести                           | Нечести          | --                         | --             |
|                                                         | Гастрит                                                                                                            | --                              | Много<br>редки   | --                         | --             |
|                                                         | Хиперплазия на венците                                                                                             | --                              | Много<br>редки   | --                         | --             |
|                                                         | Интестинален<br>ангиоедем                                                                                          | --                              | --               | Много<br>редки             | --             |
|                                                         | Гадене                                                                                                             | Нечести                         | Чести            | --                         | Чести          |
|                                                         | Панкреатит                                                                                                         | --                              | Много<br>редки   | --                         | Много<br>редки |
|                                                         | Повръщане                                                                                                          | Нечести                         | Нечести          | --                         | Чести          |
| Хепатобилиарни<br>нарушения                             | Отклонения в<br>чернодробните<br>функционални<br>показатели,<br>включително<br>повишаване на<br>серумния билирубин | --                              | Много<br>редки** | С<br>неизвестна<br>честота | --             |
|                                                         | Хепатит                                                                                                            | --                              | Много<br>редки   | --                         | --             |
|                                                         | Интрахепатална<br>холестаза, жълтеница                                                                             | --                              | Много<br>редки   | --                         | Редки          |





| MedDRA<br>системо-органични<br>класове       | Нежелани реакции                                                                                     | Честота                         |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                              |                                                                                                      | амлодипин/<br>валсартан/<br>НСТ | амлодипин                  | валсартан                  | НСТ                        |
| Нарушения на<br>кожата и<br>подкожната тъкан | Алоpecia                                                                                             | --                              | Нечести                    | --                         | --                         |
|                                              | Ангиедем                                                                                             | --                              | Много<br>редки             | С<br>неизвестна<br>честота | --                         |
|                                              | Булозен дерматит                                                                                     | --                              | --                         | С<br>неизвестна<br>честота | --                         |
|                                              | Реакции, наподобяващи<br>кожен лупус<br>еритематодес,<br>реактивиране на кожен<br>лупус еритематодес | --                              | --                         | --                         | Много<br>редки             |
|                                              | Еритема мултиформе                                                                                   | --                              | Много<br>редки             | --                         | С<br>неизвестна<br>честота |
|                                              | Екзантем                                                                                             | --                              | Нечести                    | --                         | --                         |
|                                              | Хиперхидроза                                                                                         | Нечести                         | Нечести                    | --                         | --                         |
|                                              | Реакции на<br>свръхчувствителност*                                                                   | --                              | Много<br>редки             | --                         | Редки                      |
|                                              | Пруритус                                                                                             | Нечести                         | Нечести                    | С<br>неизвестна<br>честота | --                         |
|                                              | Пурпура                                                                                              | --                              | Нечести                    | --                         | Редки                      |
|                                              | Обрив                                                                                                | --                              | Нечести                    | С<br>неизвестна<br>честота | Чести                      |
|                                              | Обезцветяване на<br>кожата                                                                           | --                              | Нечести                    | --                         | --                         |
|                                              | Уртикария и други<br>видове обрив                                                                    | --                              | Много<br>редки             | --                         | Чести                      |
|                                              | Некротизиращ васкулит<br>и токсична епидермална<br>некролиза                                         | --                              | С<br>неизвестна<br>честота | --                         | Много<br>редки             |
|                                              | Ексфолиативен<br>дерматит                                                                            | --                              | Много<br>редки             | --                         | --                         |
|                                              | Синдром на Stevens-<br>Johnson                                                                       | --                              | Много<br>редки             | --                         | --                         |
|                                              | Едем на Quincke                                                                                      | --                              | Много<br>редки             | --                         | --                         |





| MedDRA<br>системо-органични<br>класове                                        | Нежелани реакции                                       | Честота                         |           |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                               |                                                        | амлодипин/<br>валсартан/<br>НСТ | амлодипин | валсартан                  | НСТ                        |
| Нарушения на<br>мускулно-<br>скелетната<br>система и<br>съединителна<br>тъкан | Артралгия                                              | --                              | Нечести   | --                         | --                         |
|                                                                               | Болки в гърба                                          | Нечести                         | Нечести   | --                         | --                         |
|                                                                               | Оток на ставите                                        | Нечести                         | --        | --                         | --                         |
|                                                                               | Мускулни спазми                                        | Нечести                         | Нечести   | --                         | С<br>неизвестна<br>честота |
|                                                                               | Мускулна слабост                                       | Нечести                         | --        | --                         | --                         |
|                                                                               | Миалгия                                                | Нечести                         | Нечести   | С<br>неизвестна<br>честота | --                         |
|                                                                               | Болка в крайниците                                     | Нечести                         | --        | --                         | --                         |
|                                                                               | Оток на глезените                                      | --                              | Чести     | --                         | --                         |
| Нарушения на<br>бъбреците и<br>пикочните<br>пътища                            | Повишен креатинин в<br>кръвта                          | Нечести                         | --        | С<br>неизвестна<br>честота | --                         |
|                                                                               | Микционни нарушения                                    | --                              | Нечести   | --                         | --                         |
|                                                                               | Ноктурия                                               | --                              | Нечести   | --                         | --                         |
|                                                                               | Полакурия                                              | Чести                           | Нечести   | --                         | --                         |
|                                                                               | Бъбречна дисфункция                                    | --                              | --        | --                         | С<br>неизвестна<br>честота |
|                                                                               | Остра бъбречна<br>недостатъчност                       | Нечести                         | --        | --                         | С<br>неизвестна<br>честота |
| Нарушения на<br>възпроизводител-<br>ната система и<br>гърдата                 | Бъбречна<br>недостатъчност и<br>увреждане              | --                              | --        | С<br>неизвестна<br>честота | Редки                      |
|                                                                               | Импотентност                                           | Нечести                         | Нечести   | --                         | Чести                      |
| Общи нарушения<br>и ефекти на<br>мястото на<br>приложение                     | Гинекомастия                                           |                                 | Нечести   | --                         | --                         |
|                                                                               | Абазия, нарушения в<br>походката                       | Нечести                         | --        | --                         | --                         |
|                                                                               | Астения                                                | Нечести                         | Нечести   | --                         | С<br>неизвестна<br>честота |
|                                                                               | Дискомфорт,<br>неразположение                          | Нечести                         | Нечести   | --                         | --                         |
|                                                                               | Умора                                                  | Чести                           | Чести     | Нечести                    | --                         |
|                                                                               | Болка в гърдите, която<br>не е свързана със<br>сърцето | Нечести                         | Нечести   | --                         | --                         |
|                                                                               | Оток                                                   | Чести                           | Чести     | --                         | --                         |
|                                                                               | Болка                                                  | --                              | Нечести   | --                         | --                         |
|                                                                               | Пирексия                                               | --                              | --        | --                         | С<br>неизвестна<br>честота |





| MedDRA<br>системо-органични<br>класове | Нежелани реакции                          | Честота                         |           |                      |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|-------------|
|                                        |                                           | амлодипин/<br>валсартан/<br>НСТ | амлодипин | валсартан            | НСТ         |
| Изследвания                            | Повишаване на липидите                    | --                              | --        | --                   | Много чести |
|                                        | Повишаване на уреята в кръвта             | Нечести                         | --        | --                   | --          |
|                                        | Повишаване на пикочната киселина в кръвта | Нечести                         | --        | --                   | --          |
|                                        | Глюкозурия                                | --                              | --        | --                   | Редки       |
|                                        | Понижен калий в кръвта                    | Нечести                         | --        | --                   | --          |
|                                        | Повишен калий в кръвта                    | --                              | --        | С неизвестна честота | --          |
|                                        | Повишаване на телото                      | Нечести                         | Нечести   | --                   | --          |
|                                        | Понижаване на телото                      | --                              | Нечести   | --                   | --          |

\* Вижте точка 4.4 Фоточувствителност

\*\* Най-често свързано с холестаза

#### Описание на избрани нежелани реакции

Немеланомен рак на кожата: въз основа на наличните данни от епидемиологични проучвания е наблюдавана зависима от кумулативната доза връзка между НСТ и НМРК (вж. също точки 4.4 и 5.1).

#### Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

### 4.9 Предозиране

#### Симптоми

Няма опит със случаи на предозиране с амлодипин/валсартан/НСТ. Главният симптом на предозиране с валсартан вероятно е изразена хипотония и замаяност. Предозирането с амлодипин може да доведе до екстремна периферна вазодилатация и вероятно рефлексна тахикардия. Има съобщения за случаи на изразена и потенциално пролонгирана системна хипотония, включително шок с фатален изход при предозиране с амлодипин.

Некардиогенен белодробен оток се съобщава рядко като последица от предозиране с амлодипин, който може да се прояви със забавено начало на ефекта (24-48 часа след поглъщане) и да изисква изкуствена вентилация. Ранните реанимационни мерки (включително натоварване с течности) за поддържане на перфузията и сърдечния дебит могат да бъдат ускоряващи фактори.

#### Лечение

##### Амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид

Клинично значимата хипотония поради предозиране на Диперам НСТ изисква извършване на сърдечно-съдова реанимация, включваща често мониториране на сърдечната честота и дишането.





функция, повдигане на крайниците и внимание по отношение на циркулаторния обем и диурезата. Приложението на вазоконстриктор може да е от полза за възстановяване на съдовия тонус и артериалното налягане, в случай че няма противопоказания за приложението му. Интравенозното приложение на калциев глюконат може да е от полза за преодоляване на ефекта от блокадата на калциевите канали.

#### Амлодипин

Ако продуктът е погълнат наскоро могат да се обсъждат стимулиране на повръщането или стомашна промивка. Приложението на активен въглен при здрави доброволци непосредствено или до два часа след поглъщането на амлодипин значимо намалява абсорбцията на продукта. Амлодипин не може да бъде отстранен чрез хемодиализа.

#### Валсартан

Валсартан не може да бъде отстранен чрез хемодиализа.

#### Хидрохлоротиазид

Предозирането с хидрохлоротиазид е свързано със загуба на електролити (хипокалиемия, хипохлоремия) и хиповолемия в резултат на ексцесивната диуреза. Най-честите признаци и симптоми на предозиране са гадене и сънливост. Хипокалиемията може да предизвика мускулни спазми и/или изразена сърдечна аритмия, свързана с едновременната употреба на дигиталисови гликозиди или определени антиаритмични лекарствени продукти. Не е установена степента на очистване на хидрохлоротиазид при хемодиализа.

## **5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА**

### **5.1 Фармакодинамични свойства**

Фармакотерапевтична група: Средства, действащи върху ренин-ангиотензиновата система, ангиотензин II рецепторни блокери, други комбинации, АТС код: C09DX01.

#### Механизъм на действие

Диперам НСТ е комбинация от три антихипертензивни съставки с допълващ се механизъм на контрол на артериалното налягане при пациенти с есенциална хипертония: амлодипин принадлежи към класа на калциевите антагонисти, валсартан към класа на ангиотензин II рецепторни блокери, а хидрохлоротиазид към класа на тиазидните диуретици. Комбинацията на тези съставки има адитивен антихипертензивен ефект.

#### Амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид

##### Клинична ефикасност и безопасност

Амлодипин/валсартан/НСТ е изпитван в двойно-сляпо, активно контролирано проучване при пациенти с хипертония. Общо 2271 пациенти с умерена до тежка хипертония (средното изходно систолно/диастолно артериално налягане е било 170/107 mmHg) са лекувани с амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид, 10 mg/320 mg/25 mg, валсартан/хидрохлоротиазид 320 mg/25 mg, амлодипин/валсартан 10 mg/320 mg или хидрохлоротиазид/амлодипин 25 mg/10 mg. В началото на проучването на пациентите са назначени по-ниски дози от предписаните им терапевтични комбинации и впоследствие на 2 седмица са титрирани до пълните им терапевтични дози.

На 8 седмица средното понижаване на систолното/диастолното артериално налягане е 39,7/24,7 mmHg с Диперам НСТ, 32,0/19,7 mmHg с валсартан/хидрохлоротиазид, 33,5/21,5 mmHg с амлодипин/валсартан и 31,5/19,5 mmHg с амлодипин/хидрохлоротиазид. Тройната комбинация превъзхожда статистически значимо всяка една от трите двойни комбинации в понижаването на диастолното и систолното артериално налягане. Диперам НСТ с 32,0 mmHg на систолното/диастолното артериално налягане с амлодипин/валсартан/НСТ с 32,0 mmHg





по-голямо, отколкото с валсартан/хидрохлоротиазид, с 6,2/3,3 mmHg по-голямо, отколкото с амлодипин/валсартан и с 8,2/5,3 mmHg по-голямо, отколкото с амлодипин/хидрохлоротиазид. Оптималният антихипертензивен ефект се постига след 2 седмичен прием на максималната доза амлодипин/валсартан/НСТ. Статистически по-голям процент пациенти постигат контрол върху артериалното си налягане (<140/90 mmHg) с амлодипин/валсартан/НСТ (71%) в сравнение с всяка една от трите двойни комбинации (45-54%) ( $p < 0,0001$ ).

В подгрупа от 283 пациенти, анализ фокусиран върху амбулаторното мониториране на артериалното налягане, показва клинично и статистически по-голямо понижение на 24-часовото систолно и диастолно артериално налягане, при лечение с тройната комбинация спрямо валсартан/хидрохлоротиазид, валсартан/амлодипин и хидрохлоротиазид/амлодипин.

### Амлодипин

#### Механизъм на действие

Амлодипин, който влиза в състава на Диперам НСТ инхибира трансмембранното навлизане на калциеви йони в сърдечните и съдовите гладки мускули. Антихипертензивното действие на амлодипин се дължи на директния релаксиращ ефект върху съдовото съпротивление и оттам на артериалното налягане.

#### Фармакодинамични ефекти

Експериментални данни показват, че амлодипин се свързва и с дихидропиридиновите и с недихидропиридиновите места за свързване. Процесите на съкращение на сърдечния мускул и на съдовите гладки мускули са зависими от придвижването на извънклетъчните калциеви йони в клетките на мускулите през специфични йонни каналчета.

Приложението на терапевтична доза амлодипин при пациенти с хипертония се последва от вазодилатация, която води до намаляване на артериалното налягане в легнало и в изправено положение. При хронична употреба това понижаване на артериалното налягане не се съпътства от значими промени в сърдечната честота или плазмените нива на катехоламините.

Плазмените концентрации корелират с ефекта, както при млади, така и при пациенти в старческа възраст.

При хипертоници с нормална бъбречна функция, терапевтичните дози амлодипин водят до намаляване на бъбречното съдово съпротивление и увеличаване на гломерулната филтрация, и ефективния бъбречен кръвоток, без да променят филтрационната фракция или протеинурията.

Както и при другите блокери на калциевите канали, хемодинамичните измервания на сърдечната функция в покой и при натоварване (или ходене) при пациенти с нормална функция на камерите, лекувани с амлодипин, като цяло показват леко покачване на сърдечния индекс без значимо повлияване на  $dP/dt$ , или на левокамерното и диастолното налягане или обем. В проучвания за хемодинамика, амлодипин не се свързва с негативен инотропен ефект, когато се прилага в границите на терапевтичните дози при здрави животни и хора, дори когато при хора се прилага едновременно с бета-блокери.

При здрави хора и животни амлодипин не променя синоатриалната нодална функция и атриовентрикуларното провеждане. В клинични проучвания, в които амлодипин е прилаган в комбинация с бета-блокери на пациенти с хипертония или стенокардия, не са наблюдавани нежелани ефекти спрямо параметрите на електрокардиограмата.

Амлодипин е проучван при пациенти с хронична стабилна стенокардия, вазоспастична стенокардия и ангиографски документирано заболяване на коронарните съдове





### Клинична ефикасност и безопасност

#### Употреба при пациенти с хипертония

Рандомизирано, двойно-сляпо проучване за заболеваемост и смъртност ALLHAT (Антихипертензивно и липидопонижаващо лечение за профилактика на сърдечен пристъп, Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial) е проведено с цел сравняване на новите терапии: амлодипин 2,5-10 mg/ден (калциев антагонист) или лизиноприл 10-40 mg/ден (ACE инхибитор) с тиазиден диуретик хлорталидон 12,5-25 mg/ден като лечение от първа линия при пациенти с лека до умерена хипертония.

Общо 33 357 пациенти с хипертония на възраст 55 години или повече са били рандомизирани и проследени за средно 4,9 години. Пациентите са имали поне един допълнителен рисков фактор за коронарна болест на сърцето, включително предшестващ миокарден инфаркт или инсулт (>6 месеца преди включване в проучването) или доказано друго атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване (над 51,5%), захарен диабет тип 2 (36,1%), липопротеини с висока плътност - холестерол <35 mg/dl или <0,906 mmol/l (11,6%), левокамерна хипертрофия, диагностицирана чрез електрокардиограма или ехокардиографски (20,9%), настоящи пушачи (21,9%).

Първичната крайна точка е била съставен показател от фатален коронарен инцидент или нефатален миокарден инфаркт. Не са наблюдавани значими различия по отношение на първичната крайна точка между терапията с амлодипин и терапията с хлорталидон: коефициент на риск (Risk Ratio, RR) 0,98 95% CI (0,90-1,07)  $p=0,65$ . При вторичните крайни точки, честотата на сърдечна недостатъчност (компонент на съставната комбинирана сърдечно-съдова крайна точка) е била сигнификантно по-висока в групата на амлодипин, отколкото в групата на хлорталидон (10,2% спрямо 7,7%, RR 1,38, 95% CI [1,25-1,52]  $p<0,001$ ). Въпреки това, не се наблюдават значими различия по отношение на общата смъртност между групата на терапия с амлодипин и тази на терапия с хлорталидон RR 0,96 95% CI [0,89-1,02]  $p=0,20$ .

### Валсартан

#### Механизъм на действие

Валсартан е перорално активен, мощен и специфичен ангиотензин II рецепторен блокер. Той въздейства селективно върху AT<sub>1</sub> рецепторен подтип, който е отговорен за познатите въздействия на ангиотензин II.

### Клинична ефикасност и безопасност

Приложението на валсартан при пациенти с хипертония води до понижаване на артериалното налягане без повлияване на пулсовата честота.

При повечето пациенти, след еднократен перорален прием, началото на антихипертензивното действие е в рамките на 2 часа, а пика в понижаването на артериалното налягане се достига в рамките на 4-6 часа. Антихипертензивният ефект продължава над 24 часа след приема. При редовен прием максимума в редуцията на артериалното налягане с всяка доза, като цяло, се постига в рамките на 2-4 седмици.

### Хидрохлоротиазид

#### Механизъм на действие

Основното място на действие на тиазидните диуретици са дисталните извити каналчета в бъбрека. Доказано е, че в бъбречната кора съществува рецептор с висок афинитет, който представлява основното място на свързване за действието на тиазидните диуретици и за инхибиране на транспорта на NaCl в дисталните извити каналчета. Тиазидните диуретици действат чрез инхибиране на Na<sup>+</sup>Cl<sup>-</sup> симпортер, вероятно чрез конкуриране за мястото за свързване на Cl<sup>-</sup>, и по този начин повлияват механизмите на електролитна реабсорбция: директно повишавайки екскрецията на натрий и хлор в приблизително еднаква степен, а също и индиректно чрез диуретичното си действие, намалявайки плазменния обем с последващо понижаване на плазмената ренинова активност, секреция на алдостерон и загуба на калий в урината, както и намаляване на нивата на серумния калий.





### Немеланомен рак на кожата

Въз основа на наличните данни от епидемиологични проучвания е наблюдавана зависимост от кумулативната доза връзка между хидрохлоротиазид и НМРК. Едно проучване включва популация, състояща се от 71 533 случая на БКК и 8629 случая на СКК, и популация от съответно 1 430 833 и 172 462 подходящи контроли. Високата употреба на НСТ (кумулятивно  $\geq 50\,000\text{ mg}$ ) е свързана с коригирано отношение на шансовете (Odds Ratio, OR) 1,29 (95% CI: 1,23-1,35) за БКК и 3,98 (95% CI: 3,68-4,31) за СКК. Наблюдавана е ясна връзка кумулативна доза-отговор както за БКК, така и за СКК. Друго проучване показва възможна връзка между рака на устните (СКК) и експозицията на НСТ: за 633 случая на рак на устните е подбрана популация от 63 067 подходящи контроли, като се използва стратегия за вземане на проби, определена от риска. Демонстрирана е връзка кумулативна доза-отговор с коригиран OR 2,1 (95% CI: 1,7-2,6) нарастващ до OR 3,9 (3,0-4,9) за висока употреба ( $\sim 25\,000\text{ mg}$ ) и OR 7,7 (5,7-10,5) за най-високата кумулативна доза ( $\sim 100\,000\text{ mg}$ ) (вж. също точка 4.4).

### Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на резултатите от проучванията с Диперам НСТ във всички подгрупи на педиатричната популация при есенциална хипертония (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

### Други: двойно блокиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС)

Две големи рандомизирани контролирани проучвания, ONTARGET [ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial – текущо глобално изпитване за крайни точки на телмисартан, самостоятелно и в комбинация с рамиприл] и VA NEPHRON-D [The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes – клинично проучване, свързано с развитие на нефропатия при диабет, проведено от Министерство по въпросите на ветераните], проучват употребата на комбинацията от ACE инхибитор и АРБ.

ONTARGET е проучване, проведено при пациенти с анамнеза за сърдечно-съдова или мозъчно-съдова болест или захарен диабет тип 2, придружени с данни за увреждане на ефекторни органи. VA NEPHRON-D е проучване при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия.

Тези проучвания не показват значим благоприятен ефект върху бъбречните и/или сърдечно-съдовите последици и смъртност, като същевременно са наблюдавани повишен риск от хиперкалиемия, остро увреждане на бъбреците и/или хипотония в сравнение с монотерапията. Като се имат предвид сходните им фармакодинамични свойства, тези резултати са приложими и за други ACE инхибитори и АРБ.

ACE инхибитори и АРБ следователно не трябва да се използват едновременно при пациенти с диабетна нефропатия (вж. точка 4.4).

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints – клинично проучване, проведено с алискирен при пациенти със захарен диабет тип 2 с използване на сърдечно-съдови и бъбречни заболявания като крайни точки) е проучване, предназначено да изследва ползата от добавянето на алискирен към стандартна терапия с ACE инхибитор или АРБ при пациенти със захарен диабет тип 2 и хронично бъбречно заболяване, сърдечно-съдово заболяване или и двете. Проучването е прекратено преждевременно поради повишен риск от неблагоприятни последици. Както сърдечно-съдова смърт, така и инсултът са по-чести в групата на алискирен, отколкото в групата на плацебо, а представляващите интерес нежелани събития и сериозни нежелани събития (хиперкалиемия, хипотония и бъбречна дисфункция) се съобщават по-често в групата на алискирен, отколкото в групата на плацебо.





## 5.2 Фармакокинетични свойства

### Линейност

Амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид имат линейна фармакокинетика.

### Амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид

След перорално приложение на амлодипин/валсартан/НСТ при здрави възрастни пикови плазмени концентрации на амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид се достигат съответно за 6-8 часа, 3 часа и 2 часа. Скоростта и степента на абсорбцията на амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид при амлодипин/валсартан/НСТ са същите, както при прилагането им самостоятелно.

### Амлодипин

#### Абсорбция

След перорално приложение на терапевтична доза амлодипин, пикова плазмена концентрация се достига за 6-12 часа. Абсолютната бионаличност е между 64% и 80%. Бионаличността на амлодипин не се повлиява от приема на храна.

#### Разпределение

Обемът на разпределение е приблизително 21 l/kg. *In vitro* проучвания с амлодипин показват, че приблизително 97,5% от циркулиращото лекарство се свързва с плазмените протеини.

#### Биотрансформация

Амлодипин се метаболизира основно (приблизително 90%) в черния дроб до неактивни метаболити.

#### Елиминиране

Елиминирането на амлодипин от плазмата е бифазно с терминален полуживот на елиминиране приблизително 30 до 50 часа. Стационарни плазмени нива се достигат след продължителен прием за 7-8 дни. 10% от оригиналния амлодипин и 60% от неговите метаболити се екскретират с урината.

### Валсартан

#### Абсорбция

След перорално приложение на валсартан пиковите плазмени концентрации се достигат за 2-4 часа. Средната абсолютна бионаличност е 23%. Храната намалява експозицията (определена чрез AUC) на валсартан с около 40% и пиковата плазмена концентрация ( $C_{max}$ ) с около 50%, въпреки това около 8 часа след приема плазмените концентрации на валсартан са подобни в групите приемали лекарството след нахранване и на гладно. Тази редукция на AUC, обаче не се съпътства от клинично значима редукция на терапевтичния ефект и по тази причина валсартан може да се приема на гладно или след нахранване.

#### Разпределение

Стационарният обем на разпределение на валсартан след интравенозно приложение е около 17 литра, което показва, че валсартан не се разпределя широко в тъканите. Валсартан се свързва във висока степен със серумните протеини (94-97%), основно със серумния албумин.

#### Биотрансформация

Валсартан не се метаболизира във висока степен, тъй като само около 20% от дозата се установява под формата на метаболити. В плазмата е установен хидроксид метаболит в ниски концентрации (по-малко от 10% AUC на валсартан). Този метаболит е фармакологично неактивен.

#### Елиминиране

Валсартан показва мултиекспоненциална кинетика на разпад ( $t_{1/2\alpha} < 1$  час и  $t_{1/2\beta}$  около 9 часа).





Валсартан се елиминира основно с фецеса (около 83% от дозата) и урината (около 13% от дозата), основно като непроменено съединение. След интравенозно приложение плазмения клирънс на валсартан е приблизително 2 l/h, а бъбречния клирънс е 0,62 l/h (около 30% от общия клирънс). Полуживотът на валсартан е 6 часа.

#### Хидрохлоротиазид

##### Абсорбция

Абсорбцията на хидрохлоротиазид след перорален прием е бърза ( $T_{max}$  около 2 часа). Увеличаването на средната AUC е линейно и е пропорционално на дозата в терапевтичния диапазон.

Ефектът на храната върху абсорбцията на хидрохлоротиазид, ако има такъв, има малка клинична значимост. Абсолютната бионаличност на хидрохлоротиазид след перорално приложение е 70%.

##### Разпределение

Привидният обем на разпределение е 4-8 l/kg. Циркулиращият хидрохлоротиазид е свързан със серумните протеини (40-70%), предимно със серумния албумин. Хидрохлоротиазид също така кумулира в еритроцитите приблизително 3 пъти повече, отколкото в плазмата.

##### Биотрансформация

Хидрохлоротиазид се елиминира предимно като непроменено вещество.

##### Елиминиране

Хидрохлоротиазид се елиминира от плазмата с време на полуживот средно 6 до 15 часа в крайната фаза на елиминиране. Няма промяна в кинетиката на хидрохлоротиазид при многократно прилагане, а кумулирането е минимално при приложение веднъж дневно. Над 95% от абсорбираната доза се екскретира като непроменено вещество в урината. Бъбречният клирънс се състои от пасивна филтрация и активна секреция в бъбречните тубули.

##### Специални популации

###### Педиатрични пациенти (на възраст под 18 години)

Няма фармакокинетични данни при педиатричната популация.

###### Пациенти в старческа възраст (на възраст 65 години или повече)

Времето за достигане на пикова плазмена концентрация на амлодипин е сходно при млади пациенти и при пациенти в старческа възраст. Има тенденция при пациентите в старческа възраст клирънса на амлодипин да намалява, което води до покачване на площта под кривата (AUC) и полуживота на елиминиране. Средната системна AUC за валсартан е по-висока със 70% при пациенти в старческа възраст в сравнение с по-млади пациенти, поради тази причина е необходимо внимание при повишаване на дозата.

Системната експозиция на валсартан е леко повишена при пациентите в старческа възраст в сравнение с младите пациенти, но това няма никакво клинично значение.

Ограничени данни предполагат, че системният клирънс на хидрохлоротиазид е намален при пациенти в старческа възраст, здрави или с хипертония, в сравнение с млади доброволци.

Тъй като трите вещества се понасят еднакво добре както от по-младите пациенти, така и от пациентите в старческа възраст се препоръчва нормална схема на прилагане (вж. точка 4.2).

##### Бъбречно увреждане

Фармакокинетиката на амлодипин не се повлиява значимо при нарушение на бъбречната функция. Както се очаква за вещество, чийто бъбречен клирънс е само около 30% от общия плазмен клирънс, не се наблюдава корелация между бъбречната функция и системният





експозиция към валсартан.

Поради тази причина пациентите с леко до умерено бъбречно увреждане могат да приемат обичайната начална доза (вж. точка 4.2 и 4.4).

При наличие на бъбречно увреждане средните пикови плазмени нива и AUC на хидрохлоротиазид са повишени, а скоростта на екскреция в урината е намалена. При пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане се наблюдава трикратно повишение на AUC на хидрохлоротиазид. При пациентите с тежко бъбречно увреждане се наблюдава 8-кратно повишение на AUC. Диперам НСТ е противопоказан при пациенти с тежко бъбречно увреждане, анурия или на диализа (вж. точка 4.3).

#### Чернодробно увреждане

Налични са много ограничени данни за приложението на амлодипин при пациенти с чернодробно увреждане. Пациентите с чернодробно увреждане имат намален клирънс на амлодипин с последващо покачване на AUC е приблизително 40–60%. При пациенти с леко до умерено хронично чернодробно заболяване експозицията към валсартан (определена чрез стойностите на AUC) е два пъти по-висока от установената при здрави доброволци (групирани по възраст, пол и тегло). Поради валсартановата компонента, Диперам НСТ е противопоказан при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точки 4.2 и 4.3).

### **5.3 Предклинични данни за безопасност**

#### Амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид

В редица предклинични проучвания за безопасност с амлодипин, валсартан, хидрохлоротиазид, валсартан/хидрохлоротиазид, амлодипин/валсартан и амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид (Диперам НСТ), проведени при различни животински видове, липсват доказателства за системна или органна токсичност, които да окажат негативно влияние върху клиничната употреба на Диперам НСТ при хора.

Предклинични проучвания за безопасност с продължителност до 13 седмици са проведени с амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид при плъхове. Комбинацията води до очаквано понижение на показателите на чревната кръвна редица (еритроцити, хемоглобин, хематокрит и ретикулоцити), повишаване на серумната урея, повишаване на серумния креатинин, повишаване на серумния калий, юктагломеруларна хиперплазия в бъбрека и фокални ерозии в жлезистия стомах при плъхове. Всички тези промени са обратими след 4-седмичен възстановителен период и се смята, че са в следствие агравирание на фармакологичните ефекти.

Комбинацията амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид не е изследвана за генотоксичност и канцерогенност, тъй като липсват доказателства за някакво взаимодействие между отделните вещества, които са отдавна на пазара. Амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид са изследвани поотделно за генотоксичност и канцерогенност с негативни резултати.

#### Амлодипин

##### Репродуктивна токсичност

Репродуктивни проучвания при плъхове и мишки показват закъсняване на датата на раждане, удължена продължителност на раждането и намалена жизнеспособност на малките при дози приблизително 50 пъти по-високи от максималните препоръчителни дози при хора, изчислени на база mg/kg.

##### Нарушения във фертилитета

Няма ефект върху фертилитета на плъхове, третирани с амлодипин (мъжки - 64 дни и женски - 14 дни преди чифтосване) в дози до 10 mg/kg/ден (8 пъти\* максималната препоръчителна доза за хора от 10 mg, изчислена на база mg/m<sup>2</sup>). В друго проучване при плъхове, при което само мъжките плъхове са третирани с амлодипинов безилат 30 дни, с доза сравнима с дозата при хора,





изчислена на база mg/kg, са установени понижени плазмени нива на фоликулостимулиращ хормон и тестостерон, както и понижаване на плътността на спермата и броя на зрели сперматиди и сертолиеви клетки.

#### Канцерогенеза, мутагенеза

Няма данни за канцерогенност при плъхове и мишки, третирани две години с амлодипин в храната в концентрации, изчислени да осигурят дневни дозови нива от 0,5, 1,25 и 2,5 mg/kg/ден. Най-високата доза (при мишки – близка до, а при плъхове – два пъти\* по-висока от максималната препоръчителна клинична доза от 10 mg, изчислена за mg/m<sup>2</sup>) е била близка до максимално допустимата доза за мишки, но не и за плъхове.

Проучвания за мутагенност не показват лекарствено-обусловени ефекти нито на генно, нито на хромозомно ниво.

\* изчислена за пациенти с тегло 50 kg

#### Валсартан

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, генотоксичност, канцерогенен потенциал, репродуктивна токсичност и токсичност за развитието.

При плъхове токсичните дози за майката (600 mg/kg/ден) по време на последните дни от бременността и периода на лактация са довели до по-ниска степен на преживяемост, по-слабо наддаване на тегло и забавено развитие (отделяне на ушната мида и отваряне на слуховия канал) на поколението (вж. точка 4.6). Тези дози при плъхове (600 mg/kg/ден) представляват приблизително 18 пъти максималната препоръчителна доза при хора на базата на mg/m<sup>2</sup> (изчисленията се отнасят за перорална доза 320 mg/ден и пациент с тегло 60 kg).

При предклиничните проучвания за безопасност високи дози валсартан (200 до 600 mg/kg телесно тегло) предизвикват при плъхове намаляване на параметрите на червените кръвни клетки (еритроцити, хемоглобин, хематокрит) и причиняват промени в бъбречната хемодинамика (леко повишаване на уреята в кръвта, бъбречна тубулна хиперплазия и базофилия при мъжките). Тези дози при плъхове (200 до 600 mg/kg/ден) представляват приблизително 6 и 18 пъти максималната препоръчителна доза при хора на базата на mg/m<sup>2</sup> (изчисленията се отнасят за перорална доза 320 mg/ден и пациент с тегло 60 kg).

При мармозетки в сравними дози промените са подобни, но по-тежки, особено в бъбреците, където промените се развиват до нефропатия, включваща повишение на уреята и креатинина в кръвта.

Наблюдава се също хипертрофия на бъбречните юктагломерулни клетки и при двата вида. Счита се, че всички промени се дължат на фармакологичното действие на валсартан, което води до продължителна хипотония особено при мармозетите. Изглежда, че терапевтичната доза на валсартан при хора не е свързана с хипертрофия на бъбречните юктагломерулни клетки.

## **6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ**

### **6.1 Списък на помощните вещества**

**Диперам НСТ 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки**  
Сърцевина на таблетките  
Целулоза, микрокристална  
Кросповидон (тип А)





Силициев диоксид, колоиден безводен  
Магнезиев стеарат

Покритие

Хипромелоза (тип 2910)  
Титанов диоксид (E171)  
Макрогол 4000  
Талк

**Диперам НСТ 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки**

Сърцевина на таблетката

Целулоза, микрокристална  
Кросповидон (тип А)  
Силициев диоксид, колоиден безводен  
Магнезиев стеарат

Покритие

Хипромелоза (тип 2910)  
Макрогол 4000  
Талк  
Титанов диоксид (E171)  
Железен оксид, жълт (E172)  
Железен оксид, червен (E172)

**Диперам НСТ 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки**

Сърцевина на таблетката

Целулоза, микрокристална  
Кросповидон (тип А)  
Силициев диоксид, колоиден безводен  
Магнезиев стеарат

Покритие

Хипромелоза (тип 2910)  
Макрогол 4000  
Талк  
Железен оксид, жълт (E172)

**Диперам НСТ 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки**

Сърцевина на таблетката

Целулоза, микрокристална  
Кросповидон (тип А)  
Силициев диоксид, колоиден безводен  
Магнезиев стеарат

Покритие

Хипромелоза (тип 2910)  
Макрогол 4000  
Талк  
Железен оксид, жълт (E172)

**6.2 Несъвместимости**

Неприложимо.

**6.3 Срок на годност**





2 години

#### **6.4 Специални условия на съхранение**

Да се съхранява под 30°C

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

#### **6.5 Вид и съдържание на опаковката**

PVC/PVDC-Alu блистери.

Видове опаковки: 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 или 100 филмирани таблетки.

Групови опаковки от 280 таблетки, включващи 20 опаковки, всяка съдържаща по 14 таблетки.

PVC/PVDC-Alu перфорирани еднодозови блистери:

Видове опаковки: 28x1, 56x1, 98x1 или 280x1 филмирани таблетки

Групови опаковки от 280 таблетки, включващи 4 опаковки, всяка съдържаща 70x1 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

#### **6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа**

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

### **7. ПРИТЕЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Sandoz d.d.  
Verovškova 57  
1000 Ljubljana  
Словения

### **8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Диперам НСТ 5 mg/160 mg/12,5 mg Рег. номер: 20190192  
Диперам НСТ 10 mg/160 mg/12,5 mg Рег. номер: 20190193  
Диперам НСТ 10 mg/160 mg/25 mg Рег. номер: 20190194  
Диперам НСТ 10 mg/320 mg/25 mg Рег. номер: 20230114

### **9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Дата на първо разрешаване: 02/09/2019

Дата на първо разрешаване за Диперам НСТ 10 mg/320 mg/25 mg: 09/06/2023

Дата на последно подновяване: 20/11/2023

### **10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА**

12/2024

