

Листовка: информация за потребителя

Нео-ангин 1,20 mg/0,60 mg/5,90 mg таблетки за смучене
2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол

Neo-angin 1,20/0,60 mg/5,90 mg lozenges
2,4 – dichlorobenzyl alcohol/amylnmetacresol/levomenthol


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нео-ангин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин
3. Как да приемате Нео-ангин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нео-ангин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация



1. Какво представлява Нео-ангин и за какво се използва

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, включително ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Нео-ангин

Не приемайте Нео-ангин

- Ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- При деца под 6 годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Нео-ангин.

Деца

Не давайте Нео-ангин на деца под 6-годишна възраст. За лечение с Нео-ангин децата трябва да могат контролирано да смучат таблетки.

Други лекарства и Нео-ангин



Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарства при перорален прием.

Нео-ангин с храни и напитки

Нео-ангин може да се приема независимо от храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Няма или има ограничени клинични данни за употребата на активните вещества при бременни жени.

Проучвания при животни не показват преки или непреки вредни ефекти по отношение на репродуктивната токсичност. Поради недостатъчна информация не е възможно напълно да се изключат рисковете за плода, поради което употребата на това лекарство не се препоръчва по време на бременност.

Кърмене

Няма достатъчно информация за отделянето на активните вещества/метаболити в кърмата. Поради това Нео-ангин не трябва да се използва по време на кърмене.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за оценка на ефектите върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Нео-ангин не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Нео-ангин таблетки за смучене съдържат кохинил червено А (E124), глюкоза и захароза

Нео-ангин таблетки за смучене съдържат оцветителя кохинил червено А (E124), който може да предизвика алергични реакции.

Нео-ангин съдържа 1,14 g глюкоза и 1,42 g захароза в една таблетка за смучене, което е еквивалентно приблизително на 10 kcal (42 kJ). Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

Този лекарствен продукт може да съдържа серен диоксид или сулфити, които рядко могат да причинят тежки реакции на свръхчувствителност и бронхоспазм.

Оцветителят в този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка за смучене, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да приемате Нео-ангин

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не Ви е предписано друго от Вашия лекар, моля спазвайте следните указания:
Възрастни и деца над 6 годишна възраст трябва да приемат по 1 таблетка за смучене 3 пъти дневно, след хранене, 3 часа. Таблетката трябва да се остави да се разтвори бавно в устата. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене.



Продължителност на лечението

Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 3-4 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза Нео-ангин

Няма съобщения за случаи на предозиране.

В много малко вероятния случай на предозиране описаните нежелани реакции могат да се засилят. В този случай се препоръчва симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Нео-ангин

Ако сте пропуснали да приемете или сте приели по-малко от необходимата доза Нео-ангин, продължете да вземате лекарството според указанията. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Нео-ангин

Няма опасност от възникване на проблеми при спиране употребата на Нео-ангин.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако получите някоя от следните нежелани реакции, спрете употребата на Нео-ангин и незабавно се свържете с Вашия лекар:

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 души): възпаление на лигавицата на устата и стомаха, като диспепсия, повръщане.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): алергични реакции, като подуване на устата, езика и устните, обрив.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Нео-ангин

Да се съхранява под 25° С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.



Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Нео-ангин

- Активните вещества са: 2,4-дихлоробензил алкохол, амилметакрезол, левоментол. Една таблетка за смучене съдържа 2,4-дихлоробензил алкохол 1,20 mg, амилметакрезол 0,60 mg, левоментол 5,90 mg
- Другите съставки са: масло от звездовиден анасон, ментово масло, захароза, глюкозен сироп, винена киселина, кохинил червено А (E124), съдържа натрий.

Как изглежда Нео-ангин и какво съдържа опаковката

Червени, кръгли, леко прозрачни таблетки за смучене.

Оригинална опаковка – картонена кутия с 12, 24, 36 и 48 таблетки за смучене в PVC/PVdC/алуминиеви блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Divapharma GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin
Германия

Производител

Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin
Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Септември 2025

