

Листовка: информация за потребителя

Нео-ангин без захар 1,20 mg/0,60 mg/5,72 mg таблетки за смучене
2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол

Neo-angin sugar free 1,20 mg /0,60 mg /5,72 mg lozenges
2,4 – dichlorobenzyl alcohol/amylnetacresol/levomenthol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нео-ангин без захар и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин без захар
3. Как да приемате Нео-ангин без захар
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нео-ангин без захар
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка Приложение 2

Към Рег. № 20000462

Разрешение № 7210 17-10-2025

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Какво представлява Нео-ангин без захар и за какво се използва

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Нео-ангин без захар

Не приемайте Нео-ангин без захар

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- При деца под 6 годишна възраст

Предупреждения и предпазни мерки

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, попитайте се с него преди да вземете този продукт.



Нео-ангин без захар не е подходящ за приложение при деца под 6 годишна възраст. Прилагането на лекарствения продукт при малки деца може да доведе до бронхоспазъм и гърчове.

Други лекарства и Нео-ангин без захар

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарства при перорален прием.

Нео-ангин без захар с храни и напитки

Нео-ангин без захар може да се приема независимо от храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Няма клинични данни за влиянието на Нео-ангин без захар по време на бременност и кърмене и затова този продукт трябва да се приема внимателно от бременни и кърмещи жени. Поради недостатъчна информация, не е възможно напълно да се изключи рискът за плода. Ето защо, ако сте бременна, моля консултирайте се с Вашия лекар преди приемането на този лекарствен продукт.

Шофиране и работа с машини

Нео-ангин без захар не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Нео-ангин без захар таблетки за смучене съдържат кохинил червено А (E124) и изомалт (E953)

Нео-ангин без захар таблетки за смучене съдържат оцветителя кохинил червено А (E124), който може да предизвика алергични реакции.

Нео-ангин без захар таблетки за смучене съдържат 2,58 g изомалт (E953), като заместител на захарта в една таблетка за смучене, което отговаря на 6 kcal (26 kJ). Това трябва да се има предвид при болни със захарен диабет. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този лекарствен продукт.

Изомалт може да има слабо изразено слабително действие

3. Как да приемате Нео-ангин без захар

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не Ви е предписано друго от Вашия лекар, спазвайте следните указания:

Възрастни и деца над 6 годишна възраст трябва да приемат по 1 таблетка за смучене всеки 2-3 часа. Таблетката трябва да се остави да се разтвори бавно в устата. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене.



Продължителност на лечението

Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 3-4 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза Нео-ангин без захар

Няма съобщения за случаи на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Нео-ангин без захар

Ако сте пропуснали да приемете или сте приели по-малка от необходимата доза Нео-ангин без захар, продължете да вземате лекарството според указанията. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Нео-ангин без захар

Няма опасност от възникване на никакви проблеми при спиране на употребата на Нео-ангин без захар.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 човека): възпаление на лигавицата на устата и стомаха

Оцветителят кохинил червено А (Е 124) може да причини алергични реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Нео-ангин без захар

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.



Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 30° C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Нео-ангин без захар

- Активните вещества са: 2,4-дихлоробензилов алкохол, амилметакрезол
левоментол
Една таблетка за смучене съдържа: 2,4-дихлоробензил алкохол 1,20 mg,
амилметакрезол 0,60 mg, левоментол 5,72 mg
- Другите съставки са: Масло от звездовиден анасон, масло от лютив мента,
изомалт, винена киселина, кохинил червено А (E124).

Как изглежда Нео-ангин без захар и какво съдържа опаковката

Червени, кръгли полупрозрачни таблетки за смучене.
Оригинална опаковка – картонена кутия с 16 и 24 таблетки за смучене
в блистери от PVC/PVdC и алуминиево фолио.

Притежател на разрешението за употреба

Divapharma GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin
Германия

Производител

Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin
Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката
Септември 2025

