

Листовка: информация за потребителя

Пенестер 5 mg филмирани таблетки

Penester® 5 mg film-coated tablets

финастериd/finasteride

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	20060455
Към Рег. №	
Разрешение №	-70007 29-09-2025
BG 44448	
№	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Пенестер и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Пенестер
3. Как да приемате Пенестер
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Пенестер
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ПЕНЕСТЕР и за какво се използва

Пенестер е инхибитор на 5-алфа-редуктазата. Той намалява размера на увеличената простатна жлеза.

Вашият лекар Ви е предписал Пенестер, защото при Вас е налице състояние, известно като доброкачествена хиперплазия на простатата или ДХП. Вашата простатна жлеза, която е разположена в близост до пикочния мехур, се е увеличила по размер и е станала причина за затруднено уриниране.

Пенестер допринася за намаляване размера на уголемената простата и за отстраняване на симптоми, свързани с уринирането. Пенестер ще помогне за намаляване на риска от развитие на внезапно спиране на уринирането (остра задръжка на урината) и необходимостта от хирургична операция.

Какво представлява простатата?

Простатата е жлеза с големината на орех, която съществува само при мъжете. Тя е разположена под пикочния мехур и обхваща уретрата - канал, през който преминава урината от пикочния мехур до върха на пениса. Главната функция на простатата е да произвежда секрет, който е съставна част на семенната течност (спермата).

Какво означава доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП)?

ДХП е доброкачествено уголемяване на простатната жлеза, което обикновено се среща при мъже на възраст над 50 години. Тъй като простатата е разположена плътно до пикочния мехур и обхваща част от уретрата, увеличаването на нейния размер може да наруши нормалното уриниране. Може да почувствате симптоми като нужда да уринирате често, особено през нощта, усещането, че трябва да уринирате незабавно, затруднение в началото на уринирането, слаба или прекъсната струя на урината или усещането, че не сте в състояние да изпразните



докрай пикочния си мехур. При някои мъже, ДХП може да доведе до сериозни проблеми, включително инфекции на пикочните пътища, внезапна неспособност за уриниране, така както и необходимост от хирургична намеса. Затова всеки мъж със симптоми на ДХП трябва да се обърне към своя лекар.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Пенестер

Не приемайте Пенестер

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към финастерид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

Заболяването, при което се предписва Пенестер, се среща само при мъжете. Жени и деца не трябва да взимат Пенестер по никакъв повод.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Пенестер.

ДХП се развива за дълъг период от време. При някои пациенти настъпва бързо подобряване на симптомите, но може да се наложи да взимате Пенестер в продължение най-малко на 6 месеца, за да установите дали подобрява Вашите симптоми. Независимо от подобрението или промяна в оплакванията, лечението с Пенестер може да намали риска от внезапно спиране на уринирането и нуждата от хирургично лечение. Трябва редовно да посещавате Вашия лекар за периодични контролни прегледи и проследяване протичането на Вашето заболяване.

ДХП на простата не е и не води до злокачествено (раково) заболяване, но рак на простатната жлеза може да доведе до уголемяване на простата. Само лекар може да прецени Вашите оплаквания и възможните причини за тях.

Пенестер може да повлияе кръвен тест, наречен ПСА. Ако са Ви направили ПСА тест, съобщете на Вашия лекар, че взимате Пенестер.

Промени в настроението и депресия

Промени в настроението като депресивно настроение, депресия и по-рядко мисли за самоубийство са съобщавани при пациенти, лекувани с Пенестер. Ако получите някой от тези симптоми, свържете се с Вашият лекар възможно най-скоро за допълнителна медицинска помощ.

Какви други предпазни мерки трябва да взема?

Пенестер е предназначен за лечение на ДХП само при мъже. Жени, които са бременни или биха могли да забременеят не трябва да са в контакт със смачкани или счупени таблетки Пенестер. Съществува риск от аномалии на половите органи на новородени от мъжки пол когато по време на бременността активната съставка на Пенестер се е абсорбирала след прием през устата или чрез кожата на майката. Ако жена, която е бременна има контакт с активната съставка на Пенестер, трябва да се консултира с лекар. Таблетките Пенестер са обвити и предпазват от контакт с активната съставка, поради което не трябва да се чупят или смачкват.

Ако Вашата интимна партньорка е или може да е бременна, трябва да избягвате контакта с Вашата семенна течност, която може да съдържа малко количество от лекарството.

Ако имате някакви въпроси, обърнете се към Вашия лекар.

Други лекарства и Пенестер

Пенестер обикновено не взаимодейства с други лекарствени продукти. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Пенестер с храна и напитки

Пенестер може да се приема със или без храна.



Бременност и кърмене

Пенестер се прилага само при мъже.

Шофиране и работа с машини

Пенестер не би трябвало да повлияе Вашата способност за шофиране или работа с техника.

Пенестер съдържа лактоза монохидрат.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Пенестер

Вземайте една таблетка всеки ден. Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Не забравяйте, че са били необходими поне няколко години, за да се увеличи Вашата простата толкова, че да може да предизвика симптомите, които имате. Пенестер може да премахне Вашите оплаквания и да контролира заболяването Ви само ако продължавате да го прилагате достатъчно дълго време.

Ако сте приели повече от необходимата доза Пенестер

Ако вземете твърде много таблетки, незабавно се свържете с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Пенестер

Старайте се да взимате Пенестер така, както е предписал Вашият лекар. Ако обаче пропуснете да вземете една доза, не взимайте допълнителна доза. Просто вземете следващата таблетка, както обикновено.

Ако сте спрели приема на Пенестер

Важно е да не спирате приема на Пенестер, ако е предписан от Вашия лекар, за да поддържате продължителен контрол на доброкачествената хиперплазия на простатата.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции, могат да настъпят при приложение на това лекарство:

Алергични реакции

Ако получите алергична реакция, спрете приема на лекарството и веднага се обърнете към Вашия лекар. Признаците могат да включват:

- обриви по кожата и сърбеж
- оток на устните или лицето Ви.

Други нежелани реакции включват:

- невъзможност за ерекция (импотентност)
- може да имате намалено желание за секс
- може да имате проблеми с еякулацията, например намалено количество сперма, освободено по време на секс. Това намалено количество сперма не засяга нормалната сексуална функция.



Посочените по-горе нежелани реакции могат да отзвучат по-късно, ако продължите да приемате Пенестер. В противен случай, обикновено те отшумяват след спиране на Пенестер. Други нежелани реакции, съобщавани при някои мъже са:

- подуване или болезненост на гърдите
- палпитации (сърцебиене)
- нарушения във функцията на черния дроб, установени при кръвни изследвания
- болка в тестисите
- невъзможност за ерекция, която може да продължи след спиране на лечението
- стерилитет при мъже и/или лошо качество на спермата.
- депресия
- намалено сексуално желание, което може да продължи след спиране на лечението
- проблеми с еякулацията

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направен оценка)

- тревожност
- мисли за самоубийство

Трябва незабавно да уведомите Вашия лекар за промени в гърдите: установяване на бучка, болка, уголемяване или отделяне на секрет от зърната, което може да се наблюдава при сериозни състояния, като например рак на гърдата.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Пенестер

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Този лекарственият продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Пенестер

- Активното вещество е: финастерид 5 mg.
- Другите съставки са: лактоза монохидрат, царевично нишесте, повидон 30, натриев докузат, натриев нишестен гликолат (тип А), магнезиев стеарат, хипромелоза, макрогол 6000, талк, титанов диоксид (E171), симетиконова емулсия SE4, железен оксид, жълт (E172).

Как изглежда ПЕНЕСТЕР и какво съдържа опаковката

Пенестер са жълти, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с диаметър 7,1 mm.



Всяка опаковка съдържа 30 филмирани таблетки (1 блистер x 30 таблетки, 2 блистера x 15 таблетки всеки или 3 блистера x 10 таблетки всеки).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Zentiva k. s.,

U Kabelovny 130, Dolni Mecholupy,

102 37 Prague 10,

Чешка република

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Дата на последно преразглеждане на листовката

18.07.2025 г.

