

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20230113
Разрешение №	06-11-2025
Одобрение №	-70733

Листовка: информация за пациента

Айсокс 0,5% капки за очи, разтвор
Aysox 0,5% eye drops, solution

моксифлоксацин
moxifloxacin

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, оптометрист (оптик) или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Айсокс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Айсокс
3. Как да използвате Айсокс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Айсокс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Айсокс и за какво се използва

Айсокс капки за очи се използва за лечение на очни инфекции (конюнктивит), причинени от бактерии. Активното вещество е моксифлоксацин - офталмологично противовъзпалително средство.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Айсокс

Не използвайте Айсокс

- ако сте алергични към моксифлоксацин или към други антибиотици от групата на хинолините или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате капки за очи.

Говорете с Вашия лекар, ако някое от следните се отнася за Вас:

- Ако получите алергична реакция към Айсокс (реакция на свръхчувствителност) или някаква нежелана реакция, моля вижте точка 4; алергичните реакции настъпват нечесто, а случаите на сериозни нежелани реакции са редки. Ако получите алергична реакция (реакция на свръхчувствителност) или някаква друга нежелана реакция, моля вижте точка 4.
- Ако носите меки контактни лещи - преустановете носенето на лещи, докато имате признаци или симптоми на очна инфекция. Вместо лещи, носете очила. Не започвайте да носите Вашите лещи, докато признаците и симптомите на инфекцията не отминат и докато не прекратите употребата на Айсокс;
- Подуване и скъсване на сухожилия са настъпвали при хора, приемащи флуорохинолони през устата или интравенозно, особено при по-възрастни пациенти при тези пациенти едновременно с кортикостероиди. Спрете да използвате Айсокс, ако получите болка или подуване на сухожилията (тендинит).



Както при всеки антибиотик, употребата на Айсокс за продължително време може да доведе до други инфекции.

Деца и юноши

Това лекарство не трябва да се използва за профилактика или емпирично лечение на гонококов конюнктивит (*Neisseria gonorrhoeae*), вкл. и гонококова офталмия на новороденото, тъй като не е ефективно за лечение на тези заболявания. Пациентите с очни инфекции, причинени от *Neisseria gonorrhoeae* трябва да бъдат подложени на подходящо системно лечение.

Това лекарство не се препоръчва за лечение на *Chlamydia trachomatis* при пациенти на възраст под 2 години, тъй като не е оценяван при такива пациенти. Пациентите на възраст над 2 години с очни инфекции, причинени от *Chlamydia trachomatis* трябва да бъдат подложени на подходящо системно лечение.

Новородените с ophthalmia neonatorum трябва да бъдат подложени на лечение, подходящо за тяхното състояние, вкл. и системно лечение в случаите, причинени от *Chlamydia trachomatis* или *Neisseria gonorrhoeae*.

Други лекарства и Айсокс

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива отпускани без лекарско предписание.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Възможно е да установите краткотрайно замъгляване на зрението непосредствено след използване на Айсокс. Не шофирайте и не работете с машини, докато зрението Ви не се проясни.

3. Как да използвате Айсокс

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Прилагайте Айсокс само в увреденото око. Използвайте Айсокс само по предписания начина или както ви е казал Вашият лекар.

Препоръчителната доза е:

Възрастни, включително и в старческа възраст, и деца: 1 капка в увреденото око или очи, 3 пъти дневно (сутрин, следобед и вечер).

Айсокс може да се използва при деца, при пациенти над 65-годишна възраст и при пациенти с чернодробни или бъбречни проблеми. Съществува много ограничена информация относно употребата на това лекарство при новородени, поради което неговата употреба при новородени не се препоръчва.

Използвайте Айсокс и в двете очи само, ако така Ви е казал Вашият лекар. Използвайте Айсокс само за накапване във Вашите очи.

Инфекцията обикновено отслабва в рамките на 5 дни. Ако не забележите подобрене, моля свържете се с Вашия лекар. Трябва да продължите да приемате капките още 2-3 дни или толкова дълго, колкото Ви е предписал Вашият лекар.



Начин на приложение:



1



2



3

1. За да запазите върха на капкомера и разтвора чисти, трябва да внимавате да не докосвате клепачите, околните зони или други повърхности с върха на капкомера на бутилката. Дръжте бутилката плътно затворена, когато не се използва.
2. Вземете бутилката Айсокс и огледало.
3. Измийте си ръцете.
4. Отворете бутилката, като внимавате да не докоснете върха на капкомер. Дръжте бутилката, насочена надолу, между палеца и показалеца.
5. Наклонете главата си назад. Издърпайте клепача надолу с чист пръст, докато се образува „джоб“ между клепача и окото (фигура 1). Капката ще попадне на това място.
6. Приближете апликатора-капкомер на бутилката близо до окото. Използвайте огледалото, ако това Ви улеснява.
7. Внимавайте да не докосвате окото, клепачите, заобикалящата ги площ или други повърхности с върха на апликатора-капкомер. Има опасност от замърсяване на капките.
8. Внимателно стиснете бутилката, за да освободите една капка разтвор Айсокс (фигура 2).
9. Ако трябва да използвате капките и за двете очи, **повторете всички предходни стъпки и с другото око, като внимателно измиете ръцете си преди да започнете.** Това ще помогне за предотвратяване на евентуално пренасяне на инфекцията от едното към другото око.
10. След като поставите Айсокс, затворете клепача и натиснете с пръст окото, в ъгълчето при носа, и задръжте така за 2-3 минути (фигура 3). Това ще попречи на Айсокс да премине към други части на тялото, и е изключително важно да се спазва при малки деца.
11. Затворете плътно капачката на бутилката веднага след употреба.

Ако капката не попадне в окото, опитайте отново.

Ако използвате повече от едно лекарство за очно приложение, трябва да изчакате поне 5 минути между поставянето на всяко едно от тях. Мазта за очи трябва да се прилага последна.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Айсокс

Незабавно измийте очите си с хладка вода. Не поставяйте повече капки за очи, докато не дойде време за следващата доза.

Ако сте пропуснали да поставите Айсокс капки за очи

Поставете дозата както е било планирано. Ако обаче вече е време за следващата Ви доза, не поставяйте пропуснатата и се върнете към Вашата обичайна схема на дозиране.

Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако случайно погълнете Айсокс, посъветвайте се веднага с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате Айсокс, продължете със следващата доза по Вашата обичайна схема. Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Обикновено, Вие може да продължите употребата на капките, освен ако реакциите не са сериозни или не получите тежка алергична реакция.

Ако получите тежка алергична реакция или ако нещо от описаното по-долу се случи, спрете веднага прилагането на Айсокс и уведомете веднага Вашия лекар: подуване на ръцете, краката, глезените, лицето, устните, устата или гърлото, които могат да причинят затруднено преглъщане или дишане, обрив или уртикария, големи мехури, пълни с течност, разранявания или язви.

Следните нежелани реакции са наблюдавани при Айсокс канки за очи.

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

- Нежелани реакции, свързани с окото: болка в окото, очно дразнене.

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

- Нежелани реакции, свързани с окото: сухота в окото, сърбеж в окото, зачервяване на окото, възпаление на повърхността на окото с увреждане на повърхността, спукване на кръвоносен съд в окото, необичайно усещане в окото, аномалии на клепача, сърбеж, зачервяване или подуване.
- Общи нежелани реакции: главоболие, неприятен вкус.

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1000 души)

- Нежелани реакции, свързани с окото: нарушение на роговицата, замъглено или намалено зрение, възпаление или инфекция на конюнктивата, напрежение в окото, подуване на окото.
- Общи нежелани реакции: повръщане, дискомфорт в носа, усещане за чуждо тяло в гърлото, намалено количество на желязо в кръвта, отклонения в чернодробните кръвни тестове, мравучкане (парестезия), болка, дразнене в гърлото.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

- Нежелани реакции, свързани с окото: очна инфекция, замъгляване на очната повърхност, подуване на роговицата, отлагания по повърхността на окото, повишено вътреочно налягане, белесг на очната повърхност, очна алергия, очна секреция, увеличено слъзоотделяне, чувствителност към светлина.
- Общи нежелани реакции: задух или затруднено дишане, промени в сърдечния ритъм, замаяност, засилване на алергичните симптоми, сърбеж, обрив, зачервяване на кожата, гадене и уртикария.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, оптометрист (оптик) или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
тел: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



5. Как да съхранявате Айсокс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първо отваряне на бутилката: 4 седмици.

Да се съхранява при температура не по-висока от 25°C в оригиналната опаковка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Айсокс

- Активните вещества са: 5,45 mg/ml моксифлоксацинов хидрохлорид (*moxifloxacin hydrochloride*), еквивалентни на 5 mg/ml моксифлоксацин (*moxifloxacin*).
- Помощни вещества: борна киселина, натриев хлорид, хлороводородна киселина, натриев хидроксид, вода за инжекции.

Как изглежда Айсокс и какво съдържа опаковката

- Бистър, зеленикаво-жълт разтвор, практически свободен от частици;
- Айсокс капки за очи, разтвор е опакован в бяла непрозрачна LDPE бутилка от 5 ml, с бяло LDPE апликатор-капкомер, затворена с бяла LDPE/HDPE капачка на винт. Бутилката е поставена в картонена опаковка заедно с листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Ворлд Медисинс Европа ЕООД
ул. „Борис Руменов“ 16
1407 София, България

Дата на последно преразглеждане на листовката: 10/2025

