

**ЛИСТОВКА**

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка Приложение 2	
Код Разр. №	20240237
Разрешение №	- 6726 06-01-2025
Срок действие №	

**Листовка: информация за потребителя**

**Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента 500 mg / 213 mg / 325 mg**

**перорална суспензия**

натриев алгинат/натриев хидрогенкарбонат/калциев карбонат

**Gaviscon Double Action Liquid Peppermint 500 mg / 213 mg / 325 mg**

**oral suspension**

sodium alginate / sodium hydrogen carbonate / calcium carbonate

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, защото тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Попитайте Вашия фармацевт, ако имате нужда от повече информация или съвет.
- Ако получите някакви нежелани реакции, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте точка 4.
- **Трябва да се консултирате с лекар, ако не се почувствате по-добре, или ако състоянието Ви се влоши след 7 дни.**

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента перорална суспензия и за какво се използва?
2. Какво е необходимо да знаете, преди да приемате това лекарство.
3. Как да приемате това лекарство.
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате това лекарство.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

**1. Какво представлява Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента перорална суспензия и за какво се използва?**

Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента перорална суспензия е комбинация от алгинат и два антиацида (калциев карбонат и натриев хидроген карбонат), която действа по два начина:

1. Образува защитна бариера върху стомашното съдържимо, за да успокои парещата болка в гръдния кош, която може да продължи до 4 часа.
2. Неутрализира излишните стомашни киселини, за да облекчи болката и дискомфорта.

Този лекарствен продукт се използва за лечение при симптоми на гастро-езофагеален рефлукс, свързани с киселини, като киселини от стомаха, киселинна регургитация и лошо храносмилане, например след хранене или по време на бременност, при възрастни и деца на възраст над 14 години.



## 2. Какво е необходимо да знаете, преди да приемате това лекарство

**Не приемайте това лекарство, ако:**

- сте алергични към някоя от съставките на това лекарство (изброени в точка 6).

**Предупреждения и предпазни мерки**

**Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента, ако:**

- Страдате или сте страдали от тежко бъбречно или сърдечно заболяване, тъй като някои соли може да повлияят на тези заболявания (посъветвайте се с Вашия лекар относно съдържанието на сол).
- Имате сериозни проблеми с бъбреците.
- Имате електролитно нарушение, което **понижава нивото на фосфати** в кръвта (хипофосфатемия).
- Знаете, че имате намалено количество стомашна киселина в стомаха си, тъй като това лекарство може да бъде по-малко ефективно.

Трябва да се избягва продължителната употреба. Както и при други антиацидни продукти, приемът на това лекарство може да прикрие симптомите на други по-сериозни основни заболявания.

**Ако симптомите продължават след 7 дни, консултирайте се с Вашия лекар.**

**Деца**

Не се препоръчва лечение на деца под 12-годишна възраст.

Съществува риск от повишени нива на натрий в кръвта (хипернатриемия) при деца с бъбречни проблеми или с възпаление на стомаха или червата (гастроентерит).

**Други лекарства и Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента перорална суспензия:**

Не приемайте това лекарство в рамките на два часа след прием на други лекарства през устата, тъй като може да попречи на тяхното действие. Това е особено важно, ако приемате антихистамини (при симптоми на алергия), антибиотици (тетрациклини и хинолони като норфлоксацин, за лечение на бактериални инфекции), желязни препарати (при нарушения, свързани с дефицит на желязо), хормони на щитовидната жлеза (при дефицит на хормони на щитовидната жлеза), противогъбични средства като кетоконазол (при лечение на гъбични инфекции), дигоксин и бета-блокери (при сърдечни заболявания), невролептици (при психични заболявания), тироксин (при недостиг на хормони на щитовидната жлеза), хлорокин (при малария), бисфосфонати (при остеопороза) и естрамустин (при рак на простатата).

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително лекарства, получени без лекарско предписание.

**Бременност, кърмене и фертилитет:**

Можете да приемате това лекарство, ако сте бременна, кърмите или планирате да имате дете. Както при всички лекарства, продължителността на лечението трябва да бъде максимално ограничена.

**Важна информация за някои от съставките на Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента перорална суспензия:**

Този лекарствен продукт съдържа 40 mg метил парахидроксибензоат (E218) и 6 mg пропилен парахидроксибензоат (E216) в доза от 10 ml, които могат да предизвикат алергични реакции (евентуално забавени).

Това лекарство съдържа 5,21 mg пропиленгликол (E1520) в доза от 10 ml.



Това лекарство съдържа 128 mg (5,6 mmol) натрий в доза от 10 ml. Максималната препоръчителна дневна доза от това лекарство съдържа 1023 mg натрий (съдържа се в готварската сол). Това се равнява на 51% от препоръчителния максимален дневен хранителен прием натрий за възрастни. Консултирайте се с Вашия фармацевт или лекар, ако се нуждаете от Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента перорална суспензия ежедневно за продължителен период от време, особено ако Ви е препоръчано да спазвате диета с ниско съдържание на сол.

Това лекарство съдържа и 130 mg (3,25 mmol) калций в доза от 10 ml. Консултирайте се с лекар, преди да приемете това лекарство, ако имате камъни в бъбреците или високи нива на калций в кръвта.

### **3. Как да приемате това лекарство**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

За перорално приложение. Разклатете добре преди употреба.

**Възрастни и деца на и над 12 години:** При поява на симптоми, приемайте 10-20 ml след хранене и преди лягане, до четири пъти дневно.

**Деца под 12 години:** Не се препоръчва за лечение на деца под 12-годишна възраст.

#### **Ако приемете повече, отколкото трябва:**

Ако приемете твърде голямо количество от това лекарство, е малко вероятно то да ви навреди. Въпреки това може да се почувствате подути и да изпитате известен абдоминален дискомфорт. Консултирайте се с Вашия лекар, ако това не отшуми.

**Ако забравите да вземете лекарството:** Ако забравите една доза, не я удвоявайте следващия път, а просто продължете с приема както преди.

### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента перорална суспензия може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако получите някоя от следните нежелани реакции, спрете приема на продукта и незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

- Много рядко (може да засегне до 1 на 10 000 души) има вероятност от алергична реакция от съставките, която може да се прояви като подуване на лицето, устните, езика или гърлото и затруднено дишане (анафилактична реакция, анафилактоидна реакция) или сърбящ кожен обрив (уртикария).
- Други симптоми могат да включват абдоминални болки, диария, гадене, повръщане, сърбеж или обрив по кожата и хрипове (bronхоспазъм).

Поглъщането на големи количества калциев карбонат, част от това лекарство, може да доведе до повишаване на рН на кръвта (алкалоза), твърде много калций в кръвта (хиперкалциемия), повишена секреция на стомашна киселина и запек. Те обикновено се появяват след прием на по-големи от препоръчителните дози.



### **Съобщаване за нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също така да съобщавате за нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Чрез съобщаване за нежелани реакции Вие можете да помогнете за осигуряване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

### **5. Как да съхранявате това лекарство**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката след EXP (месец/година). Срокът на годност се отнася за последния ден от посочения месец.

Не съхранявайте в хладилник и не замразявайте. Използвайте до 6 месеца след отваряне. Проверете дали уплътнението на капачката не е счупено, преди да използвате това лекарство за първи път.

Не изхвърляйте никакви лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазването на околната среда.

### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

**Какво съдържа това лекарство:**

Активните вещества във всяко доза от 10 ml са 500 mg натриев алгинат, 213 mg натриев хидрогенкарбонат и 325 mg калциев карбонат.

Останалите съставки са карбомер, метил (E218) и пропил (E216) парахидроксибензоати, захарин натрий, аромат на мента, натриев хидроксид и вода. Ароматът съдържа пропиленгликол (E1520).

**Как изглежда това лекарство и какво е съдържанието на опаковката:**

Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента е почти бяла до кремава суспензия с мирис и вкус на мента.

Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента се предлага в бутилки от 150, 200, 250, 300, 500 и 600 ml. Може да се достави във външна картонена опаковка. Може да се доставя с мерително устройство (естествен полипропилен), съдържащо 5 ml, 10 ml, 15 ml и 20 ml деления. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. Картонената кутия и мерително устройство може да не се предоставят на всички пазари/размери на опаковки.

**Притежател на разрешението за употреба:**

Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.

48 Iancu de Hunedoara Boulevard, Building Crystal Tower

11<sup>th</sup> Floor, District 1, Bucharest, Румъния



**Производител:**

RB NL Brands B.V.

Schiphol Boulevard 207

1118 BH Schiphol

Нидерландия

**Този лекарствен продукт е разрешен в държавите членки на ЕА под следните наименования:**

Нидерландия - Gaviscon Duo pepermuntsmaak 500 mg/ 213 mg/ 325 mg, suspensie voor oraal gebruik

Австрия - Gaviscon Dual Mintgeschmack 500 mg/213 mg/ 325 mg Suspension zum Einnehmen

България – Гавискон Двойно Действие Ликвид Мента 500 mg / 213 mg / 325 mg перорална суспензия / Gaviscon Double Action Liquid Peppermint 500 mg / 213 mg / 325 mg oral suspension

Дания - Galieve Forte

Естония – Gaviscon

Финландия – Galieve Dual Peppermint

Франция – Gaviscon Antiacide – Antireflux, suspension buvable

Унгария - Gaviscon Forte borsmenta ízű belsőleges szuszpenzió

Исландия – Galieve Forte

Латвия – Gaviscon 500 mg/213 mg/325 mg suspensija iekšķīgai lietošanai

Литва - Galieve

Норвегия – Galieve Forte

Полша – Gaviscon duo o smaku mięty

Румъния - Gaviscon Forte Mentol suspensie orală

Швеция - Galieve Dual Peppermint

**Тази листовка последно е актуализирана през декември, 2024**

