

## **ЛИСТОВКА**

Листовка: информация за потребителя

**Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента**  
**перорална суспензия в саше**  
 натриев алгинат/натриев хидрогенкарбонат/калциев карбонат

**Gaviscon Double Action Liquid Sachets Peppermint 500 mg / 213 mg / 325 mg**  
**oral suspension in sachet**  
 sodium alginate/ sodium hydrogen carbonate/ calcium carbonate

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, защото тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Попитайте Вашия фармацевт, ако имате нужда от повече информация или съвет.
- Ако получите някакви нежелани реакции, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте точка 4.
- **Трябва да се консултирате с лекар, ако не се почувствате по-добре, или ако състоянието ви се влоши след 7 дни.**

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента перорална суспензия в саше и за какво се използва?
2. Какво е необходимо да знаете, преди да приемате това лекарство.
3. Как да приемате това лекарство.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате това лекарство.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

1. **Какво представлява Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента перорална суспензия в саше и за какво се използва?**

Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента перорална суспензия в саше е комбинация от алгинат и два антиацида (калциев карбонат и натриев хидроген карбонат), която действа по два начина:

1. Образува защитна бариера върху стомашното съдържимо, за да успокои парещата болка в гърдния кош, която може да продължи до 4 часа.
2. Неутрализира излишните стомашни киселини, за да облекчи болката и дискомфорта.

Този лекарствен продукт се използва за лечение при симптоми на гастро-езофагеален рефлукс, свързани с киселини, като киселини от стомаха, киселинна регургитация и лошо храносмилане, например след хранене или по време на бременност, при възрастни и деца на възраст от 12 години.



## 2. Какво е необходимо да знаете, преди да приемате това лекарство

### Не приемайте това лекарство, ако:

- сте алергични към някоя от съставките на това лекарство (изброени в точка б).

### Предупреждения и предпазни мерки

#### Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента перорална суспензия в саше, ако:

- Страдате или сте страдали от тежко бъбречно или сърдечно заболяване, тъй като някои соли може да повлияят на тези заболявания (посъветвайте се с Вашия лекар относно съдържанието на сол).
- Имате сериозни проблеми с бъбреците.
- Имате електролитно нарушение, което понижава нивото на фосфати в кръвта (хипофосфатемия).
- Знаете, че имате намалено количество стомашна киселина в стомаха си, тъй като това лекарство може да бъде по-малко ефективно.

Трябва да се избягва продължителната употреба. Както и при други антиацидни продукти, приемът на това лекарство може да прикрие симптомите на други по-сериозни, основни заболявания.

**Ако симптомите продължават след 7 дни, консултирайте се с Вашия лекар.**

### Деца

Не се препоръчва лечение на деца под 12-годишна възраст.

Съществува риск от повишени нива на натрий в кръвта (хипернатриемия) при деца с бъбречни проблеми или с възпаление на стомаха или червата (гастроентерит).

### Други лекарства и Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента перорална суспензия в саше:

Не приемайте това лекарство в рамките на два часа след прием на други лекарства през устата, тъй като може да попречи на тяхното действие. Това е особено важно, ако приемате антихистамини (при симптоми на алергия), антибиотици (тетрациклини и хинолони, като норфлоксацин, за лечение на бактериални инфекции), желязни препарати (при нарушения, свързани с дефицит на желязо), хормони на щитовидната жлеза (при дефицит на хормони на щитовидната жлеза), противогъбични средства като кетоконазол (при лечение на гъбични инфекции), дигоксин и бета-блокери (при сърдечни заболявания), невролептици (при психични заболявания), тироксин (при недостиг на хормони на щитовидната жлеза), хлорокин (при малария), бисфосфонати (при остеопороза) и естрамустин (при рак на простатата).

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително лекарства, получени без лекарско предписание.

### Бременност, кърмене и фертилитет:

Можете да приемате това лекарство, ако сте бременна, кърмите или планирате да имате дете. Както при всички лекарства, продължителността на лечението трябва да бъде максимално ограничена.

### Важна информация за някои от съставките на Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента перорална суспензия в саше:

Този лекарствен продукт съдържа 40 mg метил парахидроксибензоат (E218) и 6 mg парахидроксибензоат (E216) в едно саше, които могат да предизвикат алергични реакции (евентуално забавени).



Това лекарство съдържа 5.21 mg пропилен гликол (E1520) в едно саше.

Това лекарство съдържа 128 mg (5,6 mmol) натрий в едно саше. Максималната препоръчителна дневна доза от това лекарство съдържа 1023 mg натрий (съдържа се в готварската сол). Това се равнява на 51% от препоръчителния максимален дневен хранителен прием натрий за възрастни. Консултирайте се с Вашия фармацевт или лекар, ако се нуждаете от Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента перорална суспензия в саше ежедневно за продължителен период от време, особено ако Ви е препоръчано да спазвате диета с ниско съдържание на сол.

Това лекарство съдържа и 130 mg (3,25 mmol) калций в едно саше. Консултирайте се с лекар, преди да приемете това лекарство, ако имате камъни в бъбреците или високи нива на калций в кръвта.

### 3. Как да приемате това лекарство

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

За перорално приложение.

**Възрастни и деца на и над 12 години:** При поява на симптоми, приемайте 10-20 ml (едно до две сашета) след хранене и преди лягане, до четири пъти дневно.

**Деца под 12 години:** Не се препоръчва за лечение на деца под 12-годишна възраст.

**Ако приемете повече, отколкото трябва:**

Ако приемете твърде голямо количество от това лекарство, е малко вероятно то да ви навреди. Въпреки това може да се почувствате подути и да изпитате известен абдоминален дискомфорт. Консултирайте се с Вашия лекар, ако това не отшуми.

**Ако забравите да вземете лекарството:** Ако забравите една доза, не я удвоявайте следващия път, а просто продължете с приема както преди.


### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента перорална суспензия в саше може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако получите някоя от следните нежелани реакции, спрете приема на продукта и незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

- Много рядко (може да засегне до 1 на 10 000 души) има вероятност от алергична реакция от съставките, която може да се прояви като подуване на лицето, устните, езика или гърлото и затруднено дишане (анафилактична реакция, анафилактоидна реакция) или сърбящ кожен обрив (уртикария).
- Други симптоми могат да включват абдоминални болки, диария, гадене, повръщане, сърбеж или обрив по кожата и хрипове (bronхоспазъм).

Поглъщането на големи количества калциев карбонат, част от това лекарство, може да доведе до повишаване на рН на кръвта (алкалоза), твърде много калций в кръвта (хиперкалциемия), повишена секреция на стомашна киселина и запек. Те обикновено се появяват след приемане на по-големи от препоръчителните дози.



### **Съобщаване за нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също така да съобщавате за нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Чрез съобщаване за нежелани реакции Вие можете да помогнете за осигуряване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

### **5. Как да съхранявате това лекарство**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и сашето след EXP (месец/година). Срокът на годност се отнася за последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 30°C. **Не съхранявайте в хладилник и не замразявайте.**

Не изхвърляйте никакви лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазването на околната среда.

### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

**Какво съдържа това лекарство:**

Активните вещества във всяко саше от 10 ml са 500 mg натриев алгинат, 213 mg натриев хидрогенкарбонат и 325 mg калциев карбонат.

Останалите съставки са карбомер, метил (E218) и пропил (E216) парахидроксибензоати, захарин натрий, аромат на мента, натриев хидроксид и вода. Ароматите съдържат пропиленгликол (E1520).

**Как изглежда това лекарство и какво е съдържанието на опаковката:**

Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента перорална суспензия в саше е почти бяла до кремава суспензия с мирис и вкус на мента.

Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента перорална суспензия в саше се предлага в картонени опаковки, съдържащи 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 48 сашета и в групова опаковка, съдържаща 48 (2x24) сашета. Не всички размери на опаковките могат да се предлагат на пазара.

**Притежател на разрешението за употреба:**

Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.

48 Iancu de Hunedoara Boulevard, Building Crystal Tower

11<sup>th</sup> Floor, District 1, Bucharest, Румъния

**Производител:**

RB NL Brands B.V.



Schiphol Boulevard 207  
1118 BH Schiphol  
Нидерландия

**Този лекарствен продукт е разрешен в държавите членки на ЕА под следните наименования:**

**Нидерландия** – Gaviscon Duo pepermuntsmaak 500 mg/ 213 mg/ 325 mg, suspensie voor oraal gebruik in sachets

**Австрия** - Gaviscon Dual Mintgeschmack

**България** – Гавискон Двойно Действие Ликвид Сашета Мента 500 mg/213 mg/325 mg перорална суспензия в саше/ Gaviscon Double Action Liquid Sachets Peppermint 500 mg/213 mg/325 mg oral suspension in sachet

**Франция** – Gaviscon Antiacide – Antireflux, suspension buvable en sachet

**Румъния** - Gaviscon Forte Mentol suspensie orală în plic

**Този листовка последно е актуализирана през септември, 2024**

