Листовка: информация за потребителя

Гавискон Ягода Таблетки 250 mg / 133,5 mg / 80 mg таблетки за дъвчене
натриев алгинат/натриев хидроген карбонат/калциев карбонат

Gaviscon Strawberry Tablets 250 mg / 133,5 mg / 80 mg chewable tablets
Sodium alginate/Sodium hydrogen carbonate/Calcium carbonate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дена не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Гавискон Ягода Таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Гавискон Ягода Таблетки
3. Как да използвате Гавискон Ягода Таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Гавискон Ягода Таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № 20150089
Разрешение № BG/MA/MP - 73286 / 28-10-2026
Одобрение №

1. Какво представлява Гавискон Ягода Таблетки и за какво се използва

Гавискон Ягода Таблетки спада към група лекарства, наречени „супресори на рефлукса", които образуват защитен слой по повърхността на стомашното съдържимо, за да възпрепятства изтичането на стомашна киселина от стомаха към хранопровода, където причинява болка и дискомфорт.

Това лекарство се използва за лечение на симптоми на гастро-езофагеален рефлукс, като киселинна регургитация, киселини от стомаха и нарушено храносмилане (свързани с рефлукса), които могат да се появят като например след хранене или по време на бременност, или при пациенти със симптоми свързани с рефлукс езофагит.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Гавискон Ягода Таблетки

Не приемайте Гавискон Ягода Таблетки

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към някоя от съставките на Гавискон Ягода Таблетки, тъй като много рядко е възможно да се появят затруднено дишане и кожни обриви (виж точка 6 за пълния списък).

Предупреждения и специални мерки
Обърнете специално внимание преди да приемете Гавискон Ягода Таблетки

- Всяка доза от 4 таблетки съдържа натрий 11,08 mmol (254,84 mg) и калций 3,2 mmol. Максималната препоръчителна дневна доза от този продукт съдържа 1012,36 mg натрий (такъв какъвто се намира в готварската сол). Това е еквивалентно на 50,9% от препоръчаната за възрастни максимална дневна доза за прием на натрий.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ •

- Гавискон Ягода Таблетки е показан само за краткосрочно лечение, освен ако не е препоръчано нещо друго от Вашия медицински специалист. Говорете с Вашия фармацевт или лекар ако трябва да приемате Гавискон Ягода Таблетки ежедневно, за продължителен период от време или редовно, особено ако сте посъветвани да спазвате диета с ниско съдържание на сол.

- Ако страдате от сериозно бъбречно или сърдечно заболяване, посъветвайте се с Вашия лекар относно количеството на тези соли, тъй като такива соли могат да повлияят на тези заболявания.

Този лекарствен продукт съдържа 8,8 mg аспартам във всяка таблетка. Този лекарствен продукт е подсладен с аспартам, източник на фенилаланин. Той може да е вреден ако имате фенилкетонурия (ФКУ), рядко генетично заболяване, при което фенилаланина се натрупва в организма, тъй като организма не може да го отделя напълно

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

Ако симптомите продължават след седем дни, консултирайте се с Вашия лекар.

Други лекарства и Гавискон Ягода Таблетки

Не приемайте този лекарствен продукт в рамките на 2 часа от приема на други лекарствени продукти през устата, тъй като може да повлияе действието на другите лекарствени продукти.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива без лекарско предписание.

Бременност, кърмене и фертилитет
Този лекарствен продукт може да се прилага по време на бременност и кърмене.

3. Как да използвате Гавискон Ягода Таблетки

За перорална употреба. Сдъвчете добре таблетката преди да преглътнете.
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни, включително в старческа възраст и деца на и над 12-годишна възраст: При появата на симптоми вземете 2 до 4 таблетки след хранене и преди сън, до 4 пъти дневно.

Деца под 12-годишна възраст: Трябва да се прилага по лекарска препоръка.

Ако сте приели повече от необходимата доза Гавискон Ягода Таблетки
Ако сте приели твърде много от този продукт може да се чувствате подут и да усетите някакъв дискомфорт в корема. Ако оплакването не премине, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Гавискон Ягода Таблетки
Ако пропуснете приема на една доза, не приемайте двойна доза следващия път, а продължете обичайния прием на лекарствения продукт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Гавискон Ягода Таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако имате някоя от тези нежелани реакции спрете приема на този лекраствен продукт и веднага се консултирайте с Вашия лекар.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ •

Много рядко (по-малко от 1 на 10 000) може да се наблюдават алергични реакции към някоя от съставките. Симптомите могат да включват кожни обриви, сърбеж, затруднено дишане, замаяност или отоци на лицето, устните, езика или гърлото. Ако изпитате някоя от тези или ако забележите реакции неописани в тази листовка спрете приема и веднага се консултирайте с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако изпитате някакви нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“” № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Гавискон Ягода Таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Гавискон Ягода Таблетки след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Само за пропиленовата опаковка: Да се използва до 6 месеца след отваряне.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Гавискон Ягода Таблетки

Всяка таблетка за дъвчене съдържа 250 mg натриев алгинат, 133,5 mg натриев хидрогенкарбонат и 80 mg калциев карбонат като активни вещества.
Другите съставки са: манитол (Е 421), макрогол 20 000, аспартам (Е 951), аромат на ягода (малтодекстрин, модифицирано нишесте (Е 1450), растително масло, пропиленгликол (Е1520)), червен железен оксид (Е 172), ксилитол, кармелоза натриева сол, магнезиев стеарат.

Как изглежда Гавискон Ягода Таблетки и какво съдържа опаковката

Гавискон Ягода Таблетки представляват светло розови, кръгли, плоски със скосени краища таблетки с мирис и вкус на ягода. Таблетките са с маркировка - сабя и кръг от едната страна и GS250 от другата страна.

Гавискон Ягода Таблетки се предлагат в следните опаковки:
Блистерни опаковки от 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 и 64 таблетки за дъвчене поставени в картонена кутия.
Полипропиленова опаковка: 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 или 2 x 24 таблетки за дъвчене.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

48 Iancu de Hunedoara Boulevard, Building Crystal Tower
11th Floor, District 1, Bucharest, Румъния

Производител
RB NL Brands B.V.
Schiphol Boulevard 207
1118 BH Schiphol,
Нидерландия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИП под следните имена

Австрия	Gaviscon Erdbeer Kautabletten
Белгия	Gaviscon aardbei 250mg kauwtabletten/fraise 250mg comprimés à croquer/ Erdbeere 250mg Kautabletten
България	Гавискон Ягода Таблетки 250 mg / 133,5 mg / 80 mg таблетки за дъвчене натриев алгинат/Натриев хидроген карбонат/Калциев карбонат
Кипър	Gaviscon Strawberry Flavour Chewable Tablets
Германия	Gaviscon Erdbeer 250mg / 133,5 mg / 80 mg Kautabletten
Гърция	Gaviscon Strawberry, Μασώμενο Δισκίο
Ирландия	Gaviscon Strawberry Chewable Tablets Sodium alginate 250mg Sodium hydrogen carbonate 133.5mg Calcium Carbonate 80 mg
Люксембург	Gaviskon fraise 250 mg comprimés à croquer
Нидерландия	Gaviscon Aardbei Kauwtabletten
Португалия	Gaviscon Morango
Румъния	Gaviscon cu aromă de căpşuni comprimate masticabile
Великобритания	Gaviscon Strawberry Flavour Chewable Tablets

Дата на последно преразглеждане на листовката: май, 2026

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ •