

## Листовка: информация за потребителя

### Иноседа 500 таблетки Inoseda 500 mg tablets

инозин пранобекс/inosine pranobex

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаките на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

#### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Иноседа и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иноседа
3. Как да приемате Иноседа
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Иноседа
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	20220013
Към Рев. № .....	БГ/17А7/16-57343
Разрешение № .....	10.01.2022
Одобрение № .....	/

#### 1. Какво представлява Иноседа и за какво се използва

Иноседа съдържа активната съставка инозин пранобекс, която се използва за лечение на някои вирусни инфекции и за засилване на естествения имунитет на организма и имунния му отговор към вирусни инфекции. Лекарството повлиява най-вече компонентите на клетъчния имунитет. То има и антивирусен ефект.

Иноседа се използва с цел да стимулира Вашата имунна система да преодолее вирусни инфекции, като:

- грип/вирусни инфекции на дихателните пътища;
- повтарящ се/рекурентен генитален херпес;
- повтарящ се/рекурентен херпес симплекс на устните;
- херпес зостер (болезнена инфекция с мехурчета по хода на нерв);
- варицела (лещенка);
- морбили (дребна шарка - инфекция на дихателните пътища с повишена температура и кожен обрив);
- паротит/заушка (вирусна инфекция, която може да доведе до подуване и болки в околоушните слюнчени жлези);
- вирусен хепатит;
- генитални брадавици и други инфекции, причинени от човешкия папилома;
- други вирусни инфекции, като инфекциозна мононуклеоза (инфекција, причинена от вируса на Епшайн-Бар), инфекция, причинена от цитомегаловирус;
- подостър склерозиращ паненцефалит (неврологично заболяване на деца и млади хора, което засяга централната нервна система).



## **2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иноседа**

### **Не приемайте Иноседа**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към инозин пранобекс или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако страдате от подагра;
- ако имате високи нива на пикочната киселина.

### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Иноседа ако:

- знаете, че имате подагра или повишени нива на пикочната киселина;
- знаете, че имате камъни в бъбреците;
- страдате от бъбречно заболяване (трябва да бъдете проследявани);
- Ви предстои продължително лечение (ще трябва да провеждате редовни изследвания на кръвта и проверка на бъбренчата и чернодробната функции). При пациенти на продължително лечение е възможно образуване на камъни в бъбреците;
- забележите признаки на алергична реакция, като обрив, сърбеж, затруднено дишане или подуване на лицето, устните, гърлото или езика. В такъв случай веднага спрете лечението и посетете лекаря си.

### **Деца**

Лекарството не трябва да се използва при деца под 1-годишна възраст.

### **Други лекарства и Иноседа**

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Ако приемате някое от изброените по-долу лекарства, обърнете специално внимание на лекаря си, тъй като те могат да взаимодействват с Иноседа:

- алопуринол или други лекарства за подагра;
- диуретици (обезводняващи лекарства);
- лекарства, които потискат имунната система, напр. след трансплантиране на орган;
- азидотимидин (лекарство за лечение на СПИН).

### **Иноседа с храна, напитки и алкохол**

Иноседа таблетки могат да се приемат със или без храна. Приемайте Иноседа с чаша вода и не сдъвквайте таблетките.

### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременно или кърмите, смятате, че може да сте бременно или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Иноседа не трябва да се прилага по време на бременност или кърмене, освен ако Вашият лекар не счита това за наложително.

### **Шофиране и работа с машини**

Иноседа не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

## **3. Как да приемате Иноседа**

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За перорално приложение.



Приемайте това лекарство със или без храна, по всяко време на деня.

**Възрастни**

Обичайната доза е по 2 таблетки до 4 пъти дневно.

**Лица в старческа възраст (над 65 години)**

Не е необходима корекция на дозата.

**Деца над 1 година възраст**

При деца с телесно тегло под 20 кг: 1 таблетка дневно/10 кг телесно тегло.

При деца с телесно тегло над 20 кг: по 2 таблетки, до 4 пъти дневно.

Вашият лекар ще определи правилната за Вас доза, в зависимост от Вашето телесно тегло и вида и тежестта на Вашето заболяване и ще Ви посъветва колко дълго да приемате лекарството. Важно е да приемате лекарството през целия период на предписаното Ви лечение, дори ако симптомите отзуваат.

**Ако сте приели повече от необходимата доза Иноседа**

До този момент няма съобщения за случаи на предозиране. Ако сте приели повече сашета от необходимото, моля свържете се с Вашия лекар.

**Ако сте пропуснали да приемете Иноседа**

Ако сте пропуснали доза, вземете я възможно най-скоро след като си спомнете, освен ако не е наблизило времето за Вашата следваща доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

**Ако сте спрели приема на Иноседа**

Ако спрете лечението, желаният ефект няма да бъде постигнат или симптомите могат да се влошат отново. Консултирайте се с Вашия лекар, преди да спрете лечението.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

**Спрете употребата на лекарството и се свържете с Вашия лекар, ако получите:**

- внезапно хриптене/свирене в гърдите;
- затруднено дишане и/или замайване;
- подуване на клепачите, лицето или гърлото;
- обрив или сърбеж (особено засягащ цялото тяло).

**При лечение с това лекарство са възможни следните нежелани лекарствени реакции.**

**Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):**

- временно повишени стойности на никочната киселина в кръвта и урината.

**Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):**

- повишени стойности на чернодробните ензими;
- повишени стойности на urea (отпадъчен продукт) в кръвта;
- кожен обрив;
- сърбеж;
- болки в ставите;
- повръщане;



- гадене;
- болки в стомаха;
- умора;
- слабост (неразположение);
- главоболие;
- световъртеж (вертиго).

**Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):**

- диария;
- запек;
- сънливост;
- невъзможност за заспиване и нарушен сън (инсомния);
- нервност;
- увеличено количество на урината (полиурия).

**С неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни):**

- болки в корема;
- подуване на лицето, устните, клепачите или гърлото (ангиоедем);
- копривна треска;
- алергична реакция, засягаща цялото тяло (анафилактична реакция);
- нарушена стабилност (замаяност);
- зачеряване на кожата (еритема).

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ № 8  
1303 София  
тел.: +359 2 8903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

**5. Как да съхранявате Иноседа**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

**6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

**Какво съдържа Иноседа**

- Активното вещество е: инозин пранобекс. Всяка таблетка съдържа 500 mg инозин пранобекс.
- Другите съставки са: царевично нишесте, повидон K-90, микрокристална целулоза, стеаринова киселина, магнезиев стеарат, пречистена вода.



**Как изглежда Иноседа и какво съдържа опаковката**

Иноседа 500 mg таблетки са бели на цвят, с притиснат надпис INO, без делителна черта, кръгли, гладки. Опаковани са в непрозрачни PVC – PVDC / Alu блистери, съдържащи 10, 20, 40 или 100 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

**Притежател на разрешението за употреба**

Ворлд Медисине Европа ЕООД  
бул. Симеоновско шосе 130, ет. 3  
1700 София  
България

**Производител**

Ворлд Медисине Европа ЕООД  
бул. „България“ № 110, вх. А, ап. 8  
София 1618  
България

**Дата на последно преразглеждане на листовката**

09/2021

