

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рез. №	20160343
Разрешение №	38733 / 03-08-2017
Одобрение №	

Листовка: информация за пациента

Нео Тирцин Ментол 5 mg/1 mg пресовани таблетки за смучене
Хлорхексидинов хидрохлорид/Лидокаинов хидрохлорид

Neo Tyrcine Menthol 5 mg/1 mg compressed lozenges
Chlorhexidine hydrochloride /Lidocaine hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нео Тирцин Ментол и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Нео Тирцин Ментол
3. Как да използвате Нео Тирцин Ментол
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нео Тирцин Ментол
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Нео Тирцин Ментол и за какво се използва

Нео Тирцин Ментол е лекарство с локално действие в устната кухина и фаринкса. Има антисептичен ефект и локално обезболяващо действие.

Нео Тирцин Ментол се препоръчва при:

- Лечение на симптомите на зачервено, възпалено гърло, заболявания на фаринкса и устната кухина, съпроводени с раздразнения като възпаление на венците, устната лигавица и афти;
- В случаи на бактериална инфекция, съпроводена с висока температура е необходимо допълнително лечение;
- Нео Тирцин Ментол не съдържа захар, което го прави подходящ и за диабетици.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Нео Тирцин Ментол

Не използвайте Нео Тирцин Ментол:

- Ако сте алергични към хлорхексидинов хидрохлорид или лидокаинов хидрохлорид, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- При деца под 6-годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Нео Тирцин Ментол.



- Нео Тирцин Ментол не трябва да се използва за дълги периоди от време със или без прекъсвания. Употребата трябва да се ограничи до необходимото достигане на облекчаване на болката и дразненето;
 - В случай на предозиране (повече от 20 таблетки за смучене дневно) има малък риск от намаляване на контрола върху гълтателния рефлекс;
 - Да се внимава при деца с анамнеза за гърчове. Това лекарството съдържа левоментол;
 - Ако приемате други лекарства, моля вижте „Други лекарства и Нео Тирцин Ментол“.
- Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако някое от изброените предупреждения се отнася или се е отнасяло до Вас, макар и в миналото.

Деца

Не използвайте това лекарство при деца под 6-годишна възраст.

Други лекарства и Нео Тирцин Ментол

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не използвайте едновременно с други дезинфектанти.

Нео Тирцин Ментол с храна, напитки и алкохол

Не са необходими специални предпазни мерки.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ако са спазени изброените предпазни мерки и предупреждения, Нео Тирцин Ментол може бъде използван при бременност и кърмене. Информирайте Вашия лекар, че приемате това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са необходими специални предпазни мерки.

Нео Тирцин Ментол съдържа левоментол и сорбитол

Нео Тирцин Ментол съдържа левоментол: бъдете внимателни при употреба при деца с анамнеза за гърчове.

Нео Тирцин Ментол съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои видове захар, свържете се с Вашия лекар преди да използвате това лекарство. Сорбитол може да има лек слабителен ефект. Енергийната стойност на сорбитол е 2,6 kcal/g.

3. Как да използвате Нео Тирцин Ментол

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство не трябва да се използва за дълъг период от време. Консултирайте се с Вашия лекар ако симптомите Ви не се повлияват или се влошават след 3-4 дни.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и деца над 12-годишна възраст: 6 до 10 таблетки дневно. Оставете таблетките да се разтопят бавно в устата Ви.

Деца и юноши

Деца над 6-годишна възраст: 3 до 5 таблетки дневно. Оставете таблетките да се разтопят бавно в устата Ви.



Нео Тирцин Ментол не трябва да се използва при деца под 6-годишна възраст.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Нео Тирцин Ментол

При правилно използване рискът от предозиране е много малък.

Симптомите на предозиране са: умора, шум в ушите, затруднено дишане, нарушения на сърдечния ритъм, нарушен контрол на гълтателния рефлекс.

Ако сте пропуснали да използвате Нео Тирцин Ментол

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели да използвате Нео Тирцин Ментол

Не са необходими специални мерки.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможните нежелани лекарствени реакции са групирани по MedDRA система-орган клас класификацията и честота: Много чести ($\geq 1/10$); Чести ($\geq 1/100$ to $< 1/10$); Нечести ($\geq 1/1,000$ to $< 1/100$); Редки ($\geq 1/10,000$ to $< 1/1,000$); Много редки ($< 1/10,000$); Неизвестни (не може да бъде определена от наличните данни)

Редки: нарушения на имунната система - анафилактични реакции (тежки алергични реакции).

Неизвестна честота: нарушения на кожата и подкожната тъкан - алергични реакции на кожата и лигавицата; Промени във вкуса. Усещане за парене върху езика.

В случай на продължителна и непрекъсната употреба може да се получи кафяво оцветяване на зъбите. Като това оцветяване е преходно и обратимо.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Нео Тирцин Ментол

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява под 25°C в оригиналната опаковка.

Не използвайте Нео Тирцин Ментол след срока на годност, отбелязан на кутията/блистера след надписа "Годен до:". Първите два символа означават месеца, следващите два или четири символа годината. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Нео Тирцин Ментол

- Активните вещества са: хлорхексидинов хидрохлорид 5 mg и лидокаинов хидрохлорид 1 mg.
- Другите съставки са: сорбитол, магнезиев стеарат, безводна лимонена киселина, левоментол.

Как изглежда Нео Тирцин Ментол и какво съдържа опаковката

Нео Тирцин Ментол е наличен в кутии с 12, 24, 36 или 48 таблетки в перфорирани еднородови блистери от PVC/PCTFE/Al фолио.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Sandoz d.d.
Verovskova 57,
1000 Ljubljana
Словения

Производител

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A.
Rijksweg 9, 2880 Bornem
Белгия

Дата на последно преразглеждане на листовката

MM/ГГГГ

