

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20000102
Разрешение №	B6/M/M/p-57233
	19. 04. 2021
Одобрение №	/

Листовка: Информация за потребителя

Зил Т, таблетки

Zeel T, tablets

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 14 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

В тази листовка:

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зил Т
3. Как да приемете Зил Т
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Зил Т
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Използва се при артроза /особено гонартроза/, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зил Т

- Не приемайте Зил Т ако имате свръхчувствителност към отровен бръшлян, арника и/или някоя от основните или помощни съставки на продукта.

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт. Пациенти с редки наследствени проблеми като галактозна непоносимост, LAPP лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция, не трябва да приемат това лекарство.

Употреба на други лекарства и Зил Т – не са известни лекарствени взаимодействия

Употреба на Зил Т с храна и напитки – няма несъвместимости.

Бременност, кърмене и фертилитет – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.



Шофиране и работа с машини – Зил Т не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Зил Т

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обикновено 3-5 пъти по 1 таблетка дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.

Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия както при деца, така и при възрастни!

- Употреба при деца - При деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно.

От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.

Над 6 год. възраст – дозата за възрастни.

- Ако сте приели повече от обичайната доза – Зил Т няма доза на предозиране

- Ако сте пропуснали да приемете Зил Т – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

- Ако сте спрели употребата на Зил Т – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции

В много редки случаи могат да се появят гастроентестинални усложнения или кожни реакции - до няколко дни след приема на лекарството. В единични случаи реакции на свръхчувствителност могат да се появят при пациенти с доказана свръхчувствителност към растения от сем. сложноцвети (Asteraceae), т.е. арника

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Зил Т

Без специални условия на съхранение.

Да се съхранява на място далече, недостъпно за деца!

Срок на годност – 5 години.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

- Какво съдържа Зил Т:

1 таблетка съдържа:

Активни вещества:

Acidum alpha-liponicum	D6	0,03 mg
Acidum silicicum	D6	3 mg
Arnica montana	D1	0,6 mg
Cartilago suis	D4	0,3 mg
Coenzym A	D6	0,03 mg
Embryo suis	D4	0,3 mg
Funiculus umbilicalis suis	D4	0,3 mg
Nadidum	D6	0,03 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D6	0,03 mg
Placenta suis	D4	0,3 mg
Rhus toxicodendron	D2	0,54 mg
Sanguinaria canadensis	D3	0,45 mg
Solanum dulcamara	D2	0,15 mg
Sulfur	D6	0,54 mg
Symphytum	D8	0,15 mg

Помощни вещества:

Магнезиев стеарат 1,5 mg

Как изглежда Зил Т и какво съдържа опаковката:

Зил Т представляват бели до почти бели кръгли таблетки с фасета, опаковани в бяла пластмасова опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставени заедно с листовката в картонена кутия

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката:

03.2021

